

加賀川東齋先生詩集



MED 483

賀川蘭齋先生產科口授目次

孕 兒 產 後 墮 胎 經 閉 經 水 破 胎 胎 衣 要 阻 血 軍 症 陰 門 胎 覆 寒 食 禁

卷之二目次

姓 娠 臨 產 小 產 脫 血 崩 漏 血 塊 小便 閉 利 破 水

死 胎 順 死 胎 逆 橫 死 胎 逆 死 胎 氣 痛 寧 胎 復 胎 雜 病 雜 類

賀川蘭香先生産科ト校

難波恭子敬 筆記

孕

孕ヲ受ルカ、タシカニ知レ難シ、或ハ十日間ナド、云々決定シ難シ、或ハ初産ト徑
 産ト異ナル様ニ云々是亦別ナキナリ徑水メクリン後孕ヲ受ルトスル故ニ其
 徑閉スルキハ前月ヲ以テ孕ヲ受ルノ時トス故ニ其初リ惡阻ノ微ヲ
 三十日メトスル又一月ヲ徑ルハ乃チ六十日ニシテ惡阻盛ナルキ又九十日頃
 ヲリサシヅ、收ルハ月未ト月首トテハ異ナルヲ有月未ナレハ三十日モラク
 ル、之月ヲ晦日追テ數ル故ニ僅ニ二四ヲ一四トス故ニ四ノビル人ハ妊スル
 度ニ四ノビルメナレハ徑水ノ寸ニ依テ遲速アル之月首ノ徑水アル人ハ妊スル
 度ニ月ノビルハナキナリ孕ハ徑水后伝ハ古ヨリノ説ナレトモ疑シキナリ
 全体徑水ハ男子ノ精ト同シ者トス故ニ徑水ノ曲ルトキハ則チ徑水カ子ヲ
 迎ニ来ルカ如シタスレハ孕ハ徑水ノ曲ル前ニ受ルトスルカ正當ナラニ
 平日ハ子宮底シマリテアルニ徑水曲ル度ニ開ク故ナリ且徑水后ト云ハ
 惡阻ノ發スルカ當ラヌ之徑水滯リシモニ惡阻ヲ發セヌモアリソレハ
 前月ニ孕ヲ受ル氏云レ又ナリ若シ徑水アリテ后トセハ惡阻ヲ發スルナラ
 又ス徑閉シタル用惡阻ノキミアルヘキナリテ又月ヲ徑テ發スルモアリ

恭按狗子ノ
 產後其腹必
 下血為淋瀝
 人ノ月用以
 微

胎動見月
百五十日迄
テ数フハ違
ヌナリ

サスレハ其径水ヲ内スルヲ即チ孕受ルトスヘシ若シソレテモ惡阻ナク
反テニ度メノ径水未ル可キ時分ニ惡阻セハ即チ前月ノ径内ハ其滞ル
ミテ孕ニアラス其惡阻ノ催シアルヲ目当トスルトキハマナカハ又ナリ
毎ニ曲ル可キ血ガ滞ル故ニ直ニナレ氣分惡クナレ氏又僅力一四ノタ
ケ故ニサレノフナレ氏来月ニ至ルトニ月分ニナル故ニ甚盛ナリ実三月
ニメ三十日ニ當ルナリ如此ミルキハ世ニ云ルハ三十日ナゴウナリ實ハ九
月ニテ四ハ二而セテ四ナリナリ先大抵ハ二而ハ十五日位ニテ免スル者
ナリ其内ニ大小凡アレハ二而ハ十四位カ版ニアル処ノ極日数ナリ其ヨリ
内ニ免スル者多クハ世ニ云ルト同ニ極ニ十四トカソヘテモ之ヲ心得
居ルヘキナリ惡阻ハ血ノ上リノ故ニ上逆嘔吐スルナリ其月ハ滞リ
サクニ月メニハ滞リ加ル故ニ劇クナリソレヨリ追々ニ胎力生長シテ
次第ニ大キナリ血ヲ以テ養ヒスル故ニ惡阻モ止ムナリ
妊娠産後ヨリ引ツキ経水ナク直ニ孕ムモノアリ是ハ月数モ知難キ
ナリ腹候ミテ見ル可シ其内胎動六日ヲ以テシレハ大ニマナカハナ
キナリナリ或ハ先滞リテニ三月ヲ経テ孕ムモノアリソレハ其経水ノ滞リ
シヨリ數レハ五六日位ヒテモ版ハ何モ候ホトノフハナクセハ月テモ五
六月位ノ版モアルモノナリソレヲ以テ世ニ三四月モナニ月モ版ニアルト云
之皆心得違ヒナリ妊娠ハ七程ニアル者ニアラス前ニモ云通り全クナ

八十日候

九十日候

五十六日候

月モサヘヲ又者ナリ其徑水五六月モシテ版候知レ又者杯ハ何日頃ヨリ
氣多アキヤイツゴヨリ叱スル様ノイアリヤト同ヘシ其養リレトキリ
三十日位ト心得テミルヘシ月ヲ徑テ候フヘシソレモ又徑内ニテ然者
モアリノ又妊娠ノ者多キナリ其内免角ニ容体モ産モアテチラズ版ノ
大小ヤ胎ノ時ヲ候フテ知ラサレハ間違ニ易キナリ
八十九日時分ハ横骨ノ中ニ事カナリテ居ルナリ九十日モナレハ横骨ヲハツレ
テ上ニ揚ルナリヌベテ蛇ノ向ハ横骨ノ中ニアル故ニ候レ又九十日ヨリ后横
骨ノ上アガツテ其処ニテ生長スルナリ五十六日時分ハ横骨ヨリ肩ミテツ
バイニツツテ宮内頃ニテ子ハ肩上迄及ハヌナリ五十九日頃ニテハ胎動カ知レ
難シ只物ノアルナキヲ候ヒミル迄及ハヌナリハ中ニ小高く外ハ平体ノ
者ナリ然シ又全体ニ版ハルヤウノ者モアリナレモ横骨ニムツクリト
九キ者アリ指リ和ラケ輕ク候ヘハ見ルナリ一面ニラウリトムクリトス
ルハ凡塊ノ多シテ徑水ノ滞ルモノニ属ナリ胎サレハ必ス物カチサハルモノ
ナリ可心得タト婦人ハ如何様ニ動クナド云ヒアテハナリ難シ故ニ先
角平生不曲ヤ否ヤヲ問フヘキナリ
凡塊ハ尺脈ノハルニ徑内ノモノハ必アル者之何レ徑内スル氏ハ氣カ内ニ
タマル故ニ張ルイアル者之塊ト云ヤウニカタマリアリテハナクドナトナク
張ルニ徑水ノ物体ニ滞ル故ニヤソノ凡塊ニモ似タルイアレモ胎下ノ道ニ

腹候為主

乳頭重者
不可為難
確

胎動

恭按者云

モ見ヘキアリ
不可概診

何れモカタマリ無キナリ妊娠ナレハ必カタマリアル者ナリ其凡塊内ニ妊
スルモ有モノナリ使塊ナトハクルミトツノミテハナク且有如モ異ナリナレ
コトヲ中央ニタマルモアレモ必スミツモアル者ミテ胎ト異ナリ氣塊ハ積
氣ナリミテ此ハ脈脈ノ方杯筋バリコレナリ是ハトクト似ヌナリ但血塊ハ
ヨク似テ別チ堅キ者ナリ別ニナアリ
指頭ノ脈大ナリト云氏決シテ護レ難シ氣衝ノ脈ナトハ倍スルヤウ
フモアレ氏此トテモアレニナス且腰腹ノアタリヲハ婦人忌嫌ヒテ
之ハニイロワレモノミ非ス乳頭ノ黒キナトモアレニワナラヌ者ナリ妊娠
スレハ黒クナルト云ハ即チ径水滯リタルカラ黒クナルナリ何モ
子ヲ孕ムカラト云フハナキ故ニ徑内ノ者モ黒クナリ乳モ生ルア
リ一ツモアレニナラヌナリ妊娠モテモ乳出ヌアアリタ黒カラヌ者
モアリ血人ニヨリ本ヨリ黒キ者アリサスレハケ様ノフハツモ候トスルニ
ラス只脈ヲ候フ主トスルニ径水ノナキ内ニ孕ムハ知レ難シ婦人自
分ニモ系程月ヲ徑テ動クヤウニナラ子ハ氣モ付ヌナリ大形六七
ハ四頃ミテモ氣ノ付ヌフ多シワレハ前ニ云通り何ツゴロ動クモ
ラ同テ動ク初メルニ六頃ト定テ數レ定リテ六頃ヨリ動クモノ
ナリ其六頃モ徑水ノ月末ニ止ムト月頭ニ止トテハ大ニ違ヒ有ナリ月
首ニ止ムハ五頃カラ動キ月末ヲハ七頃ニモカハラ子ハ動カヌナリ

六月份位ハ婦人ノ自ラ動ル知ル斗リニテ人ハ知ル程ノナシ胎動
ノ甚キニ至テハ衣ノ外ニ見ルテ有ル者ニ至テ胎動クハヨクモ来リ
動キ過ルト是モヨクシカラス大抵カヨキニ
背面側首ト云カ當リ前ナレモ背面テハナク右面ノ極見ナリ胎必右
腹ニヨリナリト云カ中央ニアル者ナリ其胎候フニ何ナク足ヤキナリ極ナ
モノ也モナリ其方ニ面スルニ在ニアレハ右面シカナレハたニ面シ然レモ
ルト云テハ萬分ニテ皆右ニヨル者ニ故ニ其動モ右ノ方カヨケイ動クモノ
ニテ居ツマイヲ當テ者モ必ス右ニヨリ足ヲ引ツル様ノ一モアリツレ
ハ卧サシメテ整胎スレハ血ル者ナリ胎産スル時分ニモ背面ノ者カ其マ、出
ルニヨリハ右ノ方ヨリ腹ノミナシテ後ケ身ノキナリ胎産ニナルハ其子
ルルニ子ジ産フテ大方其マ、ニテ左面シテ有モノニ背面ニナレハ早ヤ
出ルニ故ニ難産ニハナラヌナリ横産ナドモ必タナキナ出スナリ此モ右
面ノ故ニヤ病ノ多スニモ皆右ニ付クナリ
胎ノ初テ成ルハ先胎衣ヨリ大臍帶モ胎ニ成ル初メハ先五塊ノ如ク其ニ
筋ウスキタル者ナリツレカ腹ノトワレ傳クナリテ所謂傳膜ニナル内子
カ生長スルニ從テ大キクタル者ニ三月份イテモ二体備ル者ニテ惣体
人ノ四支ノ出来ルモ前後アル者ニ非ス此時ニ出来ルモノノ手カ出来レ
ハ早ヤ指ノナリニ子トモナホトシタル者ニ五月份イニ至テモ男女

候孕

知レ難シ其外ハヨク明別テモ男女ノ知レ難キナリ
 候孕ハ朝起カケハ知レ易シ腹モ肌モ空虚ニ成テ何モ夜ハ寝タニ
 依テ後フナト云テハ無ナリ妊娠ノ者早朝ハホト大キ見ルヤフノ
 有モ此ノ義之腹ハ仕脉通りニアル者之ヲ右ニ偏ルニ非ス但シ小産スル
 ヤウノ者ナレハ偏ヨリモアレモ正産ニハ無キ者ナリ若シ偏ニア
 レハ血塊ノ多シ仕脉ハ平ヨリ沈テ字ヌ者之妊娠スルト仕脉力弱上臍
 下ニ筋直フナリ七月位ヒカウ其クイナカイガ見ルケレテモ愛ナ
 ウナリ何リ筋ノ様子ニ依ルヤ
 膜ヲ冒フテ生スルハ月足スカ子弱カニ有テ大形死スル者ナリ血ニ喉中ヲ
 破ルハ忽チ脱スナリト云テ破テモヨケレモ面ノ下ノ皮ノタケレタ処
 ヲ破ルト血ニ水出ルニ
 胎ヲ候フニ手カ知レ難ク肺ヤ頭ヤヨクワカルニ動モ脚カヨク知レ
 頭モ動キテモ知レヌナリナモ折トハ動ケル知レ難シ
 將孕ミト云コウナ腹ノハク長ク伸ヌ者ハ胎易産ナリ其腹ノ小サ
 キハ子頭カ横骨ノ向ミテアル者ナリ長ク高ク伸タル人ニアル者之短魂
 ノ人ハ空地ナキ故ニ腹大ニナル者之男ノ様ニスナリトシタル婦人ハ子頭カ
 横骨ノ向ミテアル之スクニタル女ハ大形横骨ヲハツレテアル故ニ動モス
 ハ居スミナリ害フテモアル之腹ハ前後ニ厚キハ惡ク左右ニ廣ニハ産モ易

或右破袋無一
重者破袋有聲
者無聲產

キハ十五日位イハ半分入九十日モナルトハツレレ之免角一肥満シタル
因ノ厚ク里モハ分レ難シ肉ノ厚キカチ一分難シ百位ノハ大指
次中指ノ多ニ本ミテソリト候アヘシ二十歳ノ男子ノ腹ニ赤手急疑
リアリヨク胎ニ依タル者ノ男子ハ長クハ腹ヨリ上ニテウク胎ハ短クハ胎
故ニ能ク別レヨリ九リ子胎初メハ横骨中ニ有リ九十四モスルト横骨ノ上ニ
又ヨリ徑テカフ横骨中ニ入ルニ短女ノ人ハ腹ニテリニ横骨ノ間ニ居テ
又ツレハ悪レ腹ノ大キハ赤程サカダマウニ見テモ又ニ横骨ノ外ニハ
上ニカハ長高ク外ヨリ見ルト上ニ有ルヤウニ見ニル人ハ又ニ横骨ノ間ニ
能クハマツテ有ル者ナリ横骨ノ間ニ入ラヌモノハイツミテモ精カナリ指入位
ニルハ十リヲ踰スシテ生レル氏一概ハ云レヌ初ヨリ下リテアル者モナリハ
何モナリテ出ルト云ベカウヌリレ氏初ハ指カ入りモ者カ卒ニ入ラヌ様ニシハ
ナリヲ踰ヘスニ生ルニ云フモアレ氏知レヌ又産出ミテモ指ノ客ルモアレハ
当ニナラヌナリ但レ腹ノ大小ヤ月ノ候ニテ候ベキナリ腹候カチナリ
大抵節ノ前後ニ能生ルナリ

妊娠

膈帶ヲ頭ニ纏テカル者杯ハ膜ノ破レハ声ナクイツト知スニ破レニハ頭ニ
絡テアル故ニ是カチ伸サレ又故ナリ声アル位ノ産ニ難産ハ無キモノ
ナリト知ル可シ妊ハ処ヲ移サス痛ナキ者ナリ

妊娠本

妊娠中声煩シテ又極ノイアリ此ハハズナド由テイタスフアリ唾沫若
シ唾スル者アハ是ハ病ナリ又中凡ノ星ナリ半身不遂ノ症ナリ是ハ
懷妊ノ為ニ沫ス俗ニ妊娠中ハ働キ動揺スルカ能シト云何モ強テ働
ク良ハレヌナリ本ヨリ無為ニシテ嗜臥ノミシテ居ルハ惡シキナリ
全体ハ静ミシテ号々働キ過キズシテ易産スルニ長キヲ伸テ乳カツラ
ハツレル極ムハ沫之本ヨリ倒首乳ヲ飲ムイガ有ヘキナリ沫ス故ニチヲ伸
セバトテ何モ害ハナケレモ高キ処ノ物ヲ取ントスル時ハイツレ足ヲウ
マ立ル故ニ惡キニ頸帯シテアル処ヲウマ立ルトガ取ノ向ヲ引ハリ腹ヲ
破ル者之ヲモ頸帯モナク但シサシテ下ニ居ラヌ胎ナレハ何モ害無キ
又臥シテ足ヲ伸ルハ惡シト云モ絶テナキナリ隨分イカニモ自由ニスルカ
善ナリ甚シキに至テハ首足ニ縄ツカケ伸ヌ様スル者ナリハ縄ヲ解
キ自由ニ伸ヌカ善ク然レモレニ由テ足ヲ伸ルハナリ從今ニ足ヲ
患ル氏惡ニ縄ヲ解ハ直ル者ナリ決シテ懶テ戒ムヘキナリ
妊娠中ハ灸治ハ惡キハ腰ノ當リホニ灸スルトシテ血ウゴキ遠ニ墮胎
スル極ノイナリ胎力ヲナズモ其灸ニ因テ血動揺シテ下ニ止ヌ様ノ
イヲコレニ世ニ胎ヲ墮サシテ為ニサ腹ヲホニ灸ス灸ミテ胎ニヒク者ハ
アヲ子ハ血動揺スルニ付テヒイテ胎ニ及フイアルナリ其内サ腹ヨリ
ハ腰ニスルイナリ禁ス可シ但シ是ノニ里ホハ灸ヌイハカマワヌナリ

腹大

見赤水不腹

脹者

腹内水多者

短氣振痛

腹減固

又針ハ世ニ惑モセヌフニテモ子ノ無知ニハ何モカマワヌナリ友人廣后
福山人猪方子ハ針家ノ言ニ試ルニ産前ノ臍以上ニ針スレト以下
ニセ又或人産后ノ臍上ニ針シテ血ニ上逆シテ死セシフアリシト
ナリ一ツノ心得

胎腹ニ腹ノ大ナル者アリ不立腹ノ内外ノ水多キナラン臨産トツト水
子ト共ニ出ルツアルニ其様ノ子ハ死スル者多ク若十日以前モ其
水カ先ニ出ルツアルハ其子カ生シテ出ルツモルナリ在又子ナクエトノ水
ナリ張ル者アリ其ハ母子共ニ死スル者ナリ十日モ先ニ出ルハ本腹外ニ汁
リタマリタルニテ子ニサワラヌ故ニ無事ナリ曰夫腹ニ汁モ腹内ノ水タ
マルハ氣ニサワリ短氣ヤ腹痛スルヤウケツアルナリ腹外ハ元来ノハ
ナキナリ
又段々ニ腹ノ減タニナルモアリコレモニ様ナリ子ハ壯實ニシテモ母ノ養ヒ
不足メ次カニ胎ノ養衰スルモアリツレハ胎ハ本ト實シテアルノ故ニ弱
ルトナモサマシテ胎ニ己ムツ得スニ死腹ニナルニ故ニ産ノ生シントシテモ
出スニヨリ引ナリ又養ハ十分ナリテモ子ノ弱シテ故カニサクナル
アリツレハ急ニ産スルニ惣体兩方共ニ子カ小サクナル故ニ固様ノ
者ハ死胎ニモ大形易ニ産ナリ内ニアツク轉身シテ出ル後ノナリ殖
産ニナルハ本無事ニシテ生ルニキ壯實ナリ者カ出カ、テ急ニカリ出ス

恭按外而去ル
疑々感動奇
ルイラ得マズ
同ナラ戒ムル
ハシカシ

甲子初九

シテ死スルノ故ニ面生セ子ハ出ヌ者ナリ
 妊中園房ノイフ戒メ辱方トナル杯ニ決メシニルヲ無ナリコト由
 シハサハルイモ有カモ知ラ子氏先花根ノハナキ者入産后乳ヲ飲マ
 ス向ニ戒ム善之乳力悪クナリテ子ノ為ニ悪ク妊中ハカマワ又ナリ只ソ
 トツラノ勸ニテ子ニサワル者ニ非ス婦人ハナリカマハヌ者
 俗スルイフ嚴戒スレモカマワ事ニ非ス當年ハ腰湯サトミテ四ニ幾
 度モイフ毎日スルイ故ニ性ハ害ヲナスコトモ有シ故ニモシス戒ニモナリ
 美ノ熱ツギニヨリ膈ヲ吹ク多シテ夏分臭氣ナル位ノ者ヲ湯浴サ
 禁スル至ニ随分湯用マシ湯浴セシメテ可之何シ産后ハサシモ平生ニ又
 一アルハ嚴禁ス可シ平体無事ナレハ八日位イカウカマワ又ニ産后位
 大害スルイナリ其常ナラサル者イツマテモ謹テ浴ス可カラス四時初
 産ハ子宮ノ口開キ難キ陰門モ閉ク六ツカシクニテ七八時カマワハマダ
 ヲケレ氏至ラ六ケシモ有アリ廿六初産ト云氏実ノ初産稀ナリ
 可心得ナリ
 懷妊スル度ニ身体不仁ヤ腫イ出ヌ者ナリ 大ニ不化シテ居ルニモ
 直ルモアリ脚ノ ノイモマ、ア、ン者、直ル多クハ膝カ又ケル者、ソ
 シテモ年ヲ経テ愈ルイモ、ン者、又、牛カ胸、ア、ン、付テ、動カ、又、様、ノ、イ
 モ、ア、ン、之、捨、テ、置、テ、モ、一、年、バ、カ、リ、ス、ト、皆、愈、ル、ナリ、又、血、リ、兼、ル、モ、ナ、リ、

最候

胎脹

水銀

た退痛林スルツアリ産后ニモ急ニハ直リ難シ病ノ治癒力何分血ヲ
サハクヤウニスレバ可ナリ半年モ直ラヌ者ナリ
去六月時分ニ腰版ヲツバルヤ胸下ノ方ニツヨク腫ク極ニ痛ニスルアリ
逆産ニモ此候アレモソレハ大形水タマリ胃飲ノア者ニ多クアル者ニ可寄同
胞サキ方高クナルハ何レ惡候ナリ本産ニモ氣付カ有テモトマノ入者ナ
ハ無キ之少シモ難産トハ云レ又ナリ又平日ノ臨産ハ必ス又胸下上面高ク
突出スルナリ下面ニ高キハ臨産トモ云道シ
俗語ニ水銀ヲ飲メ妊セヌ云凡其位ノ一ニテ妊セヌト云フハアルヤ婦人
ハ徑水ヲ順産シテアレハ孕マヌト云フハ無キハツ之但シ徑水不順者カ何レ產者
カタト精氣力射入ストモ養フナラズシテ妊セス者ナリ又男ハモ子ナキ胎ノ
者モアリナハ九ハ婦人カノツカ主ニナリ妓娼ノ孕セヌハ別ニ故アリカレハ
毎日小産スルヤウ者ニ隨テ一度ハ孕スルツアレ其上ニ又淫シテ一夜數ニ
故ニ精水盈溢シテ胎ニナラズナリナレ其時シ得ヌ妓ナトハマ受ルナリ
ルモ此理ナリ世俗ニ云然ヲ入ル或ハ綿ヲ挿ハ林ト云ヘ凡其カヲヌ者ノ言ナリ
中ニ其位ノ一ニテ孕ヌ又程ノ一ハナキ之折節孕テモ純粹ナラズシテ直ニ鼓
雜スル故ニ産後又ナリ半人ナモ多ク淫シテ多ク御スル者ハトマラヌ又胎ナリ
敗ノ類ハ孕ムトモハマ受ケツ交ルツハセヌ者ナリ人ノ度ナキカ如キニアス
又相感通セヌ故ニ妓娼ハ孕マヌト云ヘ凡是モ同傳寢テ居ル者ヲ侵シテ

知又サ一妊スル一モアレバヌイワタ小女ノ忍レ道ケ走ル様ノ者ヲ侵シテ度ミナ
 直ニ孕ム一モアレバ何モ相感通快美セヌスミイトモ云レヌリ又妓娼ハ
 多ク房ノ置ル前タノ精水シ皆通出スル其時何レ臟カ痛ムレシラ
 シテ陰脈ト云ナリ若シ然セスト精水腐敗ノ瘡ヲ生シ温テ瘡ナリ便
 毒梅毒瘡ノ美色々要病ヲ惹スルナリ其精水タマリテ瘡ナド有ルヲ
 侵スト毒ヲ受テ梅毒ナドヲ受ルモ之アルヘシ其上品ノ妓娼ハ日ニ産スル様ニ
 ヲ力息ニテ偏世ス故ニ内ニサウナリト毒モナキナリ上品ノ者ハ穢汚スル
 一思キ故ニ劇毒ヲ受ル一有者ナリ是即チ所詣毎日小産ハ是ナリ
 ホタチ月ニ足ラスト七八回ニテ産スルモ四五回ニテ産スルモ一月ニテ産スルモ
 同義ナリ若シ一度瘡ヲ患ル者ハ二度カラハ精水ナリテ患ナキ故ニ花
 街ニテ一度病シ人ヲ辱フ一叔姪ノ妻ハ多ク房ニテ滞リ多ク病ナ
 ナリ易キ者ナリ又婦人ノ姓質ヨリ多ク淫者ハ陰中常滋潤シ易ク
 一面ニ情欲ナキ者モ有者之是ハ思齋メシナリ有テ丸様ノ者ハ又テ妊
 スル一ハナキ者之蓋是モ不具ノ要ナリ又子宮外ノ精ハ直ニ出テ佐モフ
 ナリ子宮内ニ入ルハ出ヌリシ力即チ陰脈トテ痛ニナリ子宮内ニ入ル時
 アル者ナリ其時御スルト五ニ射入シラヌ者之時ニ由テ子宮内ニ入ラヌ
 ナリ往水ニテモ四ラントスルハ即チ同ク故ニ孕ム一有ナリ
 盤腸産ハハ即チ陰提之腸ニ透入シテ産前ノ有者之情慾不用倦

勞ト易産スルト云ハ誤ナリ尙モ危極者ニ非ス公候ニモ難産易産アリ又矢瀬小原
郷ノ如キ婦人ニモ難易アリ決シテ一定スル者ニ非ス大名公家ナトハ豆ヲエボシ
日々幾度モ拾フヤシムト云極ナリ即チツラスレモ其レモ無用ニナリナリ
上ヨリ下ニ至ルマデ人皆曰シ豈異ニアラシヤ其難易ハ皆別ニ故アルニ概
ニ云ハレ又者ナリ免角自然ニハスルガヨキ之上タル者ハ手ヲ施スル者
ナラバ其通りノミシ別ニ働ケイ用止ニ及ム下タル勞倦スルナラバ矢張り
常ノ通りノミ働テ可ナリ無理ヲスレハ悪キナリ蓋然然ノ難産ナ
キハ皆自然ニ背カヌ故ナリ人ハ免角智アル靈物故ニ自然ニナラヌ
モアリ故ニマ、難産出来ルナリ不然シハ天何リ萬物ノ長タル物ノ難産
スルナリ有様ナ初アラシヤ數度ハ交ルベキ時ガ来ルト交リ止可キ時カ来
ト止メ孕ムモ其候ニテ常ノ通りニテ別ニスルハフモナリ別ニ勞スル
ハフモナク平日曰極ナリ有様易キナリ人ハ上ニ云通りニ彼是ノ説ヲ
ナシテ常ト愛シテ或ハ樂情或勞倦禁食良佩帶ト云極ニ自然ニ
背クナリ且徑水ノ節クハ己ニ産セントスル時候ニナレト婚儀ナレハ
参リニ許サヌメ自然ニ背ク其己ニ孕ミテモ亦参リ多居無度其外四
時イット云度モナク始終背クユメ具生レル者モマ、自然ニ出ヌフア
リ曰レ數多テモ猫ヤ林拂約ノ家ニ云田ル者マ、難産スナリ是モ
自然ニソムク故ナリ或ハ其毛色ノ美シキヲ撰ニテ偏ラ求メ其時ヲ

食爵

氣脹

口服

背カシムル故ナリ

妊娠中ニ古物ヲ生スルヤ口中カ燥クヤ或下劑ニヤ否ヤ則チ是頃熱
ノト何ソツ病ノアルハ血氣ノ十分ニ無クテ若クモ食ヲ子ニ取レルナリ其子必驚
口瘡ナト有ル者ナリ又渴ナトアルモノ天候乾デハ直ニ之を全休
惡候胎ヲ去スルナリ有ルナリ一婦人妊娠セ内フナリ何トク爵
胃シテシトモナリ食ハサカニ能クスル食后ハイヨク爵スナリ終日嗜飲シ
テ久シク愈ス具ハ食ヲ過ル之嚴ニ食ヲ戒シメ朝飯ヲ正サセカノ
粥ヲサシツヤリ一度ニ杯空ベニサヤシハ歳度ヲモ一杯ツ興ルナリ初日
ハ三杯又明日五六杯モナリ次第ニ増ニ從テ病ノ愈ルモ知レルナリ
後ニ自ラ吐スナリ好又ヨウニナリ何心ナリ
妊娠中ニカノ方ハ子ミテハ出テ又右ニ方ニ別ニ突出スル者アリ其氣ヲ張リ
故ニ中虚ニシテ系ナリ何モカモナリ非ス厥ノ皮ヲスナリ其子アル
ニ産前ニ口服ナリ者アリ是ハ血ノ足ラヌナリ失張胎子ノ行難ナリ故
ニ血ノ少キ故ニシカタハナキナリ

見

生ル子ニ白キ者マフレ付者ナリ而チ赤ナリ付之直ニ酒糖ノ類者ナリテ
カモウ者赤ストモ大形其子ハ弱シ血熱アル者ナル之母ノ不足ニテ表裏ノ
ユキトカ又其母姓中ニ前陰カ痒クナリナリナキ物ヲ生スル様ノナリ

舊髪

無髪

袋子
破袋有聲
無弱兒且
易産アリ

マ、有る若し其レカナキト口中痛カ若しソレカナキト是カクハ極ク有カ痛
カ何レ皆一ツノワサニ
世トモセ四月ノ子ハソダウ氏八月ノ子ハソダ、又トモ氏九極ニホス二九月ノ子モ多モ程
是レハ理ナリト蓋シハ四月ハ赤程大ニ極テ大形臨内モ月ニ極ク有ナリソレテ
モ死スルヲアル故ニヤセ八月ハ一向小サク誰カ見テモ云月スミト思フ也ニ極
ニ着スルヲアル故ニ云ナリ
児頭ノ髪モ舊キハ横骨ノカタテモナク胞衣ノカタテモナク只元来ウスキ
知ニテ舊キハ額ノハ舊キモ曰義ナリ逆産ノ者モアルハナリ横骨ノ
カム処トハ云レ又ナリ又胞衣帶ラバ頭ニナク者モ亦ス
児生レテ髪ナキ者アリ曰子生レテ生ル者之其内ニマタモノ白キヤ服中
ノ赤キハ生レツキミナ生セヌ者之白色白馬白鹿ノ髪服中ノ赤キモ同義
之白髪ノ髪ナリ其尺當時髪ノ生ヌ、后ハ必ス生スル者モ
鬢尾ニ青色アルハ胞衣ノアトナリ故ニ逆産ノ者ハ胎内ノ力ニ乏レ之以テ
カメナリトスルト云ハ非之信ニ云妊中ニ父合スルモ青色シナス云ハ本ヨリ
是ナリ鬢ハ上ナリ鬢精死心下近ツキ上ニヤ不知ノ説ナリ
袋子ト云テ冒井ナカラ出ル者アリ此ハ子弱キ之母カ息ナシト産者之希
ナル者内ノ是ト云ハ不産ナトミアル者ナリ早ク破レハヨキ之喉ノ皮
ノタレテアルカク破レハ直ニ出ナリ子ハ強キハ勢ニ甚キ故ニ張ナリ

胸脈

見徒凡頭

合而更會

初頭

症

出ルニ音ノアル様ノ者ナリ又何トナクシレニ破レル様ノ一モ有モノ之具ハサ
 示トニ勢ツヨクテハ無之聲ノアル位ノ者ヒ子弱キ一モ難産モナキモノ
 ナリ作メ袋子ヲ穿ク破子バ死スト云ハ不知ノ甚しき一且位テカ
 息ヲ止マルト死スレモ未タ息セ又内ハ死スルト云フハナキナリ
 息ノ息シテ有故ナリ胸ノ脈ハ至テ強キ者ナリイナシクナキハ
 惡キ之大人ノ脈ヨリ交テツヨキ位ノ者ナリ奈声ヒテ次ガ微ニナル
 者之直ニ純レハセ又ナリ
 石會ハ早ク収ル程善ナリ頭骨カ合ト石會カ動ク者之生レ當坐ハス
 ドリハナキナリニテ四過レ頃カウ動キ出スト即チ頭骨カ合スル
 小兒生レ時ハ頭ノ鉢四カ歩程合ワズニカル者之難産ナリモナリ
 三十日位イモスルト合シテ石會初メテ動スルナリ始ヨリ合シタル者ハナ
 ナキ之瘦肥ニヨツテ具クイナカイノヨク見ユルト見ヘ難キトナリ見頭ニ
 痛ノ様ヲブツク々トフクレテ有ル者之西方ヘ向ノ様ニフクレタルモアリ
 是ハ鉢ノ間カラウ氣ヲツキ出シテフクレル之故ニ鉢合スル様ニナルト自ラ
 直ル様ニナルナリ不可怪又頭ノカミタル陰門ヲハサレタル故ナリ
 其ハカスルト自ラ直ル之様ナリ極ニ由テユカ合或ハ様メハ直ルナト云
 一氏法ナリ極ニ此ス又別ニ不見ノ生レ付ミナリカム者アル其ハ大形
 初生ノ時カハナリ及テカワ徑ヲ見ル之生レタナハミテ正キ者ナリ

皮剥

秘製

已見

帶落

生ハ子ノ皮ヌレテムケルアリ水腫中ヨリ生ハ子ニアル元来子ノ弱
 キテハナキ之故何モカマワヌ本親ノ弱キハ子ノ弱ナルハ直ニ
 我輩ノ産ハ古ト生シ直ニアケルハ而煩ヤ居ニ出テハレテ我輩ノ産ノ極ニ
 ナル者之下割石蓋ニテ病ノ後カヨリ之白姜蚕天南星細ニテ煉リ空
 メカクナレハ酢ヲ入レ湯泉ニ洗タルナリ抄ノヤレヲ指ニキ口中ニ
 洗ヒヌクウヘキヌクワヌト口中ニヒロカルナリ

我輩ノ産ハ母ニヨルテ生レヌ内ヨリホ知ル者ハ血ヲク血熱スル極者ナリ母
 血熱リ子ニ受レナリ大抵直ニハ産セヌ者ハ一七夜ヲ過テカウ我輩ノ産ハ
 スル者ハ指ヲ置テ子カ死スル者ナリ氷研又姜古ニヌル

初生児ニ耳連大黃ヲ用ユレ氏病ナレハヌリ之散ストモ害ハナラヌ
 世医知ラヌシテ動モスハ驚風ヲ用ウサレ之然シ大黃モ産後ノ不及
 者ハ用ヒテ可之又一種此方ヲ用テモ不以下レテ惣休ニ至班ニテ歸入
 有具ハ耳連大黃ヲ冷服シテ治スル之已見ノ言又見アル之已見ニサバク
 ハ冷物ヲヤレハ直ニ之故耳連大黃ヲ冷服スル寸治スルナリ

脂帶ノ落ルハ者大抵位ニメ落ツル頃トス或ハ十日過テ落ヌモアリ其落サ
 ルハ面リ無キ故ナリ又レクノ落ストアルト要シ脂カクサル故ニルテ腹ノ面或
 ハ腹下ノタニルモ肉ニ生ル子ノ脂帶ヲ剥ニテ之者アリ此ハ力自ス
 ル頃ニテ方シナリテ又体極者アリ心得ヘシ全体如何ニテカムルト

舉法

云「ハ知子氏何レ膈帶ハ直クハサキト見ユ中屈曲シテアル内ヲ子頭
ヲツギツムトカムル」トノ云来ル「フノアルニヤ佐ニ外レトカフルト云ハ氏其佐」
テカフル者ニ非ス

子ヲ取り奉ル「ハ産後タノス」ト「此方ノカハル」ト「ア」子氏時臨「平
時」カサメテ「無キ」ハ「表示」シテ「收メシムル」ハ「先ツ生ル」寸ハ「家格」モ「コレ」氏
大抵常法「脱衣」盡「割」置人ノ方ハ「宜」島「杯」ノ「模様」ノ「盡ナリ」平ノ「土器」ヲ
用「土器」一對「青」者「ゴ」メ「奥」ニ「匹」竹「ヘ」ラ「ニ」本「凡」ケ「ニ」枚「子」緒「女」許「備」ヘ「ル
者」之「膈帶」ホ「コ」リ「ノ」コ「シ」テ「裁」ル「ヘ」シ「戸」緒「ミ」テ「ク」リ「其」外「ツ」ラ「リ」裁「ナリ」
則「ハ」ス「ヘ」リ「ラ」裁「難キ」ハ「鉄」カ「ミ」ラ「ツ」裁「ル」ハ「カ」マ「ワ」ヌ「之」概「ル」体「ミ」テ「ヤ」ラ「ラ」用
「ニ」キ「リ」終「ラ」バ「胞衣」ヲ「盡」ニ「收メ」ラ「モ」土器「モ」皆「盡」中「ニ」收ム「ヘ」シ「青」色「ハ」固
ニ「取」リ「祝」シ「ゴ」メ「ハ」子「マ」ナ「ニ」取「ル」義「ミ」ヤ「若」シ「生」ル「子」ノ「帶」下「ニ」固「テ」ヤ「物
リ」身「ニ」絡「ヒ」直「ル」ヤ「ル」者「アリ」
難キ者「之」具「匠」セ「シ」メ「板」右「腕」ヲ「セ」手「是」一「所」取「リ」寸「脈」ア「タ」リ「ヲ」枕「サ」セ「シ
メ」た「ノ」チ「ラ」室「シ」ラ「置」テ「湯」ノ「加」減「具」外「用」ヲ「治」シ「具」ハ「本」端「ノ」キ「ミ」テ「寫
ト」シ「手」ニ「ラ」キ「足」ソ「ビ」ラ「キ」又「背」ニ「向」テ「能」洗「シ」二「回」メ「ヨ」リ「米」カ「ラ」用「テ
洗」フ「リ」先「洗」ヒ「終」ル「ハ」人「ヲ」メ「湯」湯「ヲ」受「テ」具「ニ」包「ヒ」其「湯」ノ「内」衣「物
ヲ」シ「キ」其「内」亦「帛」四「枚」
ア「ケ」膈帶「ヲ」費「キ」包「ヒ」一「枚」ハ「破」テ「細」リ「又」西「端」ニ「危」リ「ア」ケ「和」織「ヒ」モ「ツ」

臍風

ケル様ニ結ヒ入ニ又ナリマムニエルト高ク廻シ一枚ハ横長クニ折リ又腸
帶ヲ色ニエテカニ其シモミツケテ皆ヨリ廻シクルニ一枚ハ長ク四ツ
ニ折リ輝リミル如ク尻ニテツクナリ其上ニムツキニテ大ニ色ニ下ノ腸ニモ
ニカノキナラ前ニ言ヒ又右ノキナモ其上ニ入ヒて其上ヲ括ミテクルニ四ツヨリ
ハ腸カ堅クナル故ニ紙ニ包ケテハ通リニクイ故ニ紙ノ中ヨリ一端破リ
ニハサムヘシ五倍子ヲフリカクレハ乾ラキヲヨキナリ
小兒胎毒ノ説ハ當ヌ又ニ又胎血ヲ受ルカウ下リモノ無ケレハ胎毒多ク下
リモノ多ケレハ胎毒サレトスルハ誤リナリ又五香湯ニ入ルニ胎毒又カヨキニ吞
テモ害ニハナラヌ又ニ又二日ヤニ何ヤ何ヤ飲ニトテモ一向カマワヌナリ
煮師ノ佐ニ兒ニ免シ飲スル前ニ大人ノ小便ヲ飲ヌ又ハ何ツニヤ童便向
精ニ得ナカウニ胸ヲヒラカス授リナル可シ大ナルマナガヒルニ小便便候
クレラ飲ルモノニ赤ス赤童便ニ向味モナク胸ハヒラケル者ナレバ其レテ
數又ハ藥ナリモ兒ノ胸凡ハ腫ニキタレテ膿ナドヲ出ル候者ニテ
ナリ在凡ハ異ナルニ矢張瘡ナリ胸凡ニナリナド程多ク入ルニカキテモ
十四日ニマテテラス黒クサナレハ切テ捨テモヨキニ最初血出ル而ハ切
ラヌナリ然レバ瘡家ニハ切ト嫌フ故ニツタニ出ル又ナリ胸凡ハ引ツケ
ノ無キ内カウロガカヌナリ頸ハツカラ色々引ツケル様ニナレバ目力
女モカハヌ又ナリ在凡ハ自ラ右ニ引ツケテ治ヌハ乳ヲ飲ルナリ

膈凡ハ只目ハ外ヘコラスニ只ウシロニソルネリナリ其時ハ下割ヲカリ
 一タクハ死スル者ナリ大人痘病ト曰極ノ者ナリ大人ニテモ目カ引ッ
 ケル積カ痼ノ多ナリ痘病ニサナリ痘病モ肩ガコルヤ齒ノアキニクイヤ
 咽ノセバクナルノ多力ザハ今ノサドニ云ナリ必ス肩ガコリ具レヨリ膿ノ多ク
 ル桃人々多ク下スシ小児モ如此ナルベキナレ其ハワカラヌ故
 ニ知レ又尺口ノアカヌミナ知ルナリ

臨產

坐草ノ術ハ婦人シテ坐セシメ后ヨリ候フナリ惣体ヨリ腰中ノ指下
婦人者ナリ餘程氣付モハゲシクナリ若シテ覺ヘル時分ニテ又ト宜シカ
ラズ縦々指シテ候フ氏案内セヌハユカヌ之先ツツルギホ求メ衣物ナ
ドカ、ケテ布ヲ覆ヤナド云テ座ヘマワリサ尻ヲアゲシメ一指ヲヌテ尻
ハ括ツカシムル其一指ニテ出產候フナリ近ク出ルホド指ヲカシツケル
極ニナツテ指カカハム候ニナリ其モバヤ近キナリ出カルト會陰ノ如
クチニテ押しハツシテナルナリエカキサレハ傷レルナリサレ引出シ
テ頭ダケ出タラハ其カウ直ニ前ニツキヤルハ直ニ出ル直ニ尻ヲ坐ミツ
ケシムヘシ何レノ婦人モ子ノアル様思フテ尻ヲカキテ出ル者之初產ノ
人ハ皮ニヒタナキ故ニ別シテ會陰ノ張リ者之皮外ニ頭カ著シルエク
アラハレ布ハ指先ニテ會陰ノ処ヲカシテ皮ノハ又極ニヌメト傷ルニ度

燥尿

目カラハ皮ニ後シアル故ニ直ニ出ル者又甚シキニ至テハ花ノ子チニ
 コクチヲ押ヘ右ノ手ニ子頭ヲ押ヘ右ノ手ニ子チリテハ指先キカトカ又
 者ナリノ産シタラバ子チヲツキ胎腹ヲミミテ床ヲツコシステヤルナリ其
 向ニ穂邊カ胞衣ヲカロスノ若シ出スハ出シテヤルナリ
 燥尿凡者ハ指ニテ方シヤルヘキナリ多クニ至テハ大張ルモノナリ腰ノ
 張振ノ一アル者ナリ若シ布ハ陰中ヨリ指ニ押シ出セハ出ル者ナリ甚
 キニ至テハ子頭ノ振ニツキケル振ニナリ布ナリ大抵産スル振ニナリト燥尿
 位ノ一ハカマワヌ者ナリ自然ニ出ルナリ用意シテ居ラヌトナリ穢
 ス故ニムツキヲナシテ故フベキナリ
 腰ノ痛ハト云ハヒモノ入ル者ニ是ハ横骨ノ方カルナリ左右ノセバキ者ニ有
 者ナリ兎角虎ノ小ク花右ノヒキカ易ク産ナリ前庭ノ厚ク花右ノ
 セバキハ出難キ者ナリ前庭ノウスクハ善キナリ長ク高クスナリ
 ト込タルハ強産ハ女キナリ胎ニ候フ子頭カ胎ヨリ見テ内ハ
 フタ下ラヌナリ陰中ヲミルニ及ハヌナリ案内ナシ陰中ヲ候フハ子漏ノ
 ニナリ覺ヘ又内ニ胎ヲ見ル序ニナリトミルナリ其奈ハシラサ子ハ産
 クモノナリ
 子頭カ下ラヌニ中殿ニアル時分ハ順産ナシモ若者ニ下カルト何レモ若
 ニハナキ之候シモム何モカモラ者ニ非ズ自ラ下ル者ニ順子モ子頭

ダケ出テ外ノ血又ツアリ其ハ出シテヤルガヨキ之生テ陰門サニ在シ
ハ術ガ施サレヌ置カヨキ之ヲモ出テチカノリガ有バ出サレル者ナ
リ大抵順産ノ胎ニカルハ稀ナリ大カタ自然ニ出ル者ナリ免角
死生ヲカニカ導ナリ其ウ知ハ誤リハ無キ大抵一日位ニ出產
スル者ハ小便ノ出ル間ハ数回ニマイルトモカマワヌハ小便内ヤ破水シテ
固マノルハ甚タ悪キ其氣付ノ痛ハ腰ノ兩方ヨリ中実ニ痛ム
心下ヤ腹脇ノ痛ハサミ息ミテハサキ又腹ノ痛ハ腰中ヨリ張レ
アリ其横骨ノ高キミテ生ルハヒマ入レハアキ又腰モ腹モ痛マ
ズ血ツハリリ覺ル者ナリツレカ又二易産ナリ
又下利セトメ痛ハ氣付トモキハシキツレハ其下利ヲ固メ下利ストム
ハ氣付ニアラス氣付ヤハ必々下ラヌ内ニ見ルハ氣付ノ痛ハ不日ク時
ヲカキリテ痛ハナリ下利セトスル痛ハ急之又同カ有テ同カ急ナリ
リ又小便頻數ニルハ氣付ナリ下利セトスル頻數ナリ者ハ取
スチカ下ラントスルト膀胱ヲ動かス故ニ小便カ數ニルハ氣付ハ必腹
張ナルヘク或ハサレツ血ノ下ル様ナリナルヘキ又赤ノ血付ナリ
モ止モテ三兩ヲ経テ生ルハ違ヒテ又餘程ヨリフモアリ又又子ノ
サカラヌ内ハミタリ何日生ルト云フハ云々カヨキ之是ハ氣付ナリ又下ラヌ
シヤ氏知シ又伝ヘキハ脈ハアテニツ又易キハ脈モカハラヌモアリ又脈ヲ知シ

ル極ニナルトモハヤ自ラ下ラ又之又其人ノ苦ミ因テ脈モ數ニナルアリ何
モアテニナラヌ又又サレテモ出カ子困若スルトリレユヘ脈カ変ズルナリ産
後ノ如キハ數ナリ

指一本后ロリサシ候フ内ニ氣付ノツク時カニ指ニ子頭サワルハ正産若シカモ
テアレハ指底モ又者之又臨産ノ時カハ脈ハ痛ナク又ニ張極者ハ小便
モ不通ナルハ近キマリレモ又氣付ノ内ノキルハ又急ハ出ヌナリ又急ハ
ル寸ハ氣付セリレクナリテ来ルナリ又心下ノ高キハ産ノ常ナレモ皆下
向ニ張ナリ若シ上向ニ急ニ高キハ臨産向ナキナリ

子頭ノ毛サラヌスル位ニ成ニテ生テ居ルハ頭カ損シテ有者ナリ頭カサカヌ
死スルトクサツキニテ頭ヲ強ク押ストクホム極ノナアル者ナリ

臨産ノ時ニ早クノ早産ニナルト宜シカラズ出産スル時カニヤルヘシ冬極養上
ハ寒クテ子死シテ赤婦人モ辱ニ登ルト直ニ出ル極ニ思フセリシクハ口
セキテ急ニ保シ症ニ固テ見合セル内ニ出ルナリナリ心得置ヘシ

指シテ内ニ急ニツク指ニ症スルト息ミソクナリ臨時叩捧ス
ヘシ

臨産ナドヨク傷合スル者ニテ多クハ必出産スルナリ至極食滞ナリ嘔吐スル位
ノナリテ氣付モノニ非ス其食時ノ滞ルト云カ即チ出ヌル処カラズ長
モ滞ル極ニナルナリ故ニ急ニ氣付ニルナリ病家ハ食滞カラ催スルナリ

産后記略
かた

氣付の時分ニ堅スル者アリヤマリを強テ進ムト由テアリ又急スル
スルリ生体何モサレテ惡キ候ニ進ス大形昇產者有難産候ハ
叱咤スル極ノ下ナキ本子ツツヨクニ上ニ至ル至又知ナリ産后ニテモ叱咤
シテ止マ者アリツレモ食ヲ節シ強テ施サセ子六直ナリ吐ツヨクナ
ル死スル位ノ者ハ子モ必ズ死スル一休ニ子カ弱クナ者良スル様ノア
生テ居ル内ニ母ノ死スルト云フナキ之母ノ死スルニ子ノ生テ居ルト云フハ
論ナキ之早ク生マシテヤルカヨキ

産前ホタ付氣ヌ内カラフ叱咤アリテ居ニ進ムト由テアリ其カレ氣付テ
カラフ叱咤ハ前ニ云通り及テナキナリ一旦ハ氣付テ極テモ直ニ生ル産后
ヲ経テ叱咤スル者アリ直ニ叱咤スルト死スル候アリハ随分急ナリ
カ息倚ヌル者ハ易産シ仰ク者ハ横産ノクハイ惡キ故ニシル者生ルニ
マカヘナリ

願後

臨産ナルト子宮ノ口ハ下底ニク者ナリ子宮カ
口ハ見ヘス頭ロサワリツラ子宮口開リト云テ其ハマダマハ又カラナリ
一對臨産轉スルト形如此ナリト見ル候ナリ故ニ指ヲ指サス其末々臨
マシル者ハ形如此後ヨリ入レテ候ナリ折詰具ノ臨マサル轉セサルニ
直ニツツワリ見テ子宮口開リト云ヘ何レテ最和ハハ然者ナリ其頭
見タマハ指ヲ順ニ上ニテアクルトモモナク後戸ノウヘツクニ由

世に世に圖室ニテ急生テアル者アリシハ果産ニ至リ直ニ尾門ニ向テ
血ニツキカハルヲ有者ナリシテ大便ノハツムト云テ則ニツク故ニカ息シテ
先ニナリ経産ノ人ニモ矢張大便ノ通スルト思テ息ム故ニ生レナリ心
得テ登園ス可カウス
臨月ニ至リモ小便便内スル者アリト氣付メアル者ナリ小便ノハ即小便ス
ルナリ

産後

凡直ニ下腹痛
ムト云ハ経産ノ人
ト知レハ因テ初
産ト云テイワ
ルモノモアレ其
痛ニテ直ニ下
リタトヘイタ
ム氏初産ノ人
ハレシニ産
ニ又テ痛ヌ
産後ハ腹ニコリテ塊ノ如キ者アル者ナリ知テ又者ハ血塊ト思ヒ攻メ決テ
カミテ是ハ子宮ノ収ラヌナリ胎盤ニテモ血ヲ経ニ從テスホシ産直ニ見ルト但
和カフニテ張テアルナリ一ロモタツト右ノ腹ニツキキ堅マリ而シテ経徒テ又
次ニ少クナツテカミ移リ後ハリハ又右ノ脇間ニ収リ僅錢程ニナリナリ
産後収リ遲シ是ハカツキ上ルト禁聲ノ術スル如ク見枕痛ト云カアト取
ノ痛ニナリ子宮ノ急ニ緊縮シテ痛シヌナリ初産ノ人ハ収リカ遅シ
故ニナキハ経産ハ定テアル者ナリカタマリウチウク極ニ痛ナリ甚シ
キ至テハ冷汗ノ出ルホトノモアナリナレ死ニ至リ者亦ス痛ナシハ吉
候ナリ此ハテシキハ救術ノイニナリ見枕痛ヲ押ヘルハ其ハ子
ノトエニツキナリ痛ムニ其ヲ和カニ押ヘテ下ケ右ノ腹下ニ押ヒ極ス
ルナリ強テ押トヌテ痛ニ隨テ和カニ押ス可シ其内ニ下リ物ナド有テナリ実

シマリナキ故
血道早ク
トシテ痛難
産痛ニシテ

産后上宜用
石炭酸

ニ子宮収ラント痛ムノトモ痛ハノ故ニ思ヤ一ニ非ス輕ク押ヘ居テ子バ堪ラレ
ヌ者ノナリ放スト血ニ痛ムノ傍人ニテモ教ヘ押ヘサスベシ一実ハ摺直ニモ
コナレ基シキ者ハ色モカワル位ニ痛モ強ク堪ヘラズ一居ル寸ニ用ユベキ
ナリ一産后血ニアル者一児枕痛ハ右ト左其レハ當テニサウ又モナリ
前ニ云フ通り一産ノ當ハ直ニ右ノ方ニアルニ一ロメ位カラ中ヨリサレニナク
九ロ位ニナルト右ノ方ニ依コトナリ位ニナリ根方ノ下ニ収ル者ナリリス
ハ右ノ方ニ何リ節テモアルヤ右ノ方ニ位スルヤ知レヌ又初産ハ子宮ノ収
リ遅レレハ産ノ難易ニヨル者ナリ一輕キトナモ其時ノ劇易ニ因テ産速
アルナリ一産后無事ナリ一用ヒス氏ヨケレ氏不得己ハ道遠敷ナリモヨシ
痛テモアレハ折衝々折ニ附子ヲ加ヘテモヤルヘキナリ
産后ニ腹ヲ摺ヌルハ血シカラズ多クハ上逆スル極ナリ一産後トカ子宮収ル
ヲ見テ塊シ収ムルナリ一子宮ヲ摺下スル極ナリ一血シカラズ又児枕痛ノ劇
ニ極上レ氏強クハ為ヌカ宜シキナリ一只動揺サスル極ニスルマテナリナリ
産后ノ上逆スルハ一五カ一ス多クハ内ニ熱マル者ナリ一石炭酸ニテ摺メルカヨシ
辰砂ヲトモ可レレシ一上衝モナク熱モナク一尺脈痛ナドアルハ折衝々ヨリハ
七味病氣ガヨキナリ一産后ニ耳鳴者ハ難止候シ一養作有時者ハ是直ナリ
終ニ始止サル者ハ不候ナリ一終ニ身ヲ建テ上レ血脈ニテ鳴下上逆スルトナリ
精血ノ脱スルハ胸ニ動ナリ一臥ハ不逆ニ面赤クナリ一鳴ハ上逆ナリ一紫切者ナリ

産后上戸
大便

愈々産后逆スル大渴や頭痛トスル者ハ必ス大熱ヲモレ劇シクナルト
云々在スルニ至ル乳ガサシ出スニシワビウホ生ノ極ニルナルト終ニ乳ハ出ス
ニ乳ニナルヘキ血カ皆上ニ上行スル故ナリ其カワリニ産后下リ物及テ多キコトナ
リ乳出又故ニ後水早ノ曲リ至ル者ナリ又頭中カビツク極痛スモナリ
此ハ逆治ニ至張り石黒劑カヨキニ上げテウズニ無首症云々在スル者ハ逆ニ成スル
氣カワリノ上げスルニ付テ血ヲ上行スル者ハ臥サシテ血同ヨリ土指カヲテ掌ヲ
空クシテ極テラセシ横腹ニテ下ス者ハ謂フ立熱按背為單ニ見コト推量テ
モコラレハ兎牝毒ヲ按ヘルモ曰義ニテ山ヨ時ノフセギハ尺病人ノ氣ヲシツ
メル極ニスルカ方ニ極ヤウカ要キト及テアシキナリ
産后と逆スルト不大便スルアリテ下シテモ大抵下ラヌ者ハ自利ニ便ナシ
凡テ之ヲ下シテハ害リニ下利セス下ルトモカマワヌ隨テ下割リ知ニテニ手黄丸
愛ニテモ下ラヌアリスベテ産后と逆ヤ舌ノ痛マ不食ハ六柴胡湯ヲヤリテ
置テ血ルノ兎耳右黒カヨキニ甚シキハ身体痺スル極ニナルトモ有ル者ハ伏
脚氣ノ如キアリテ有リ
産后ニテ七八月ハ經水大抵ハナキ早ク出ルハ惡シク為テ又ニガ乳ハ惡
シクナリ徑水曲リテモ隨テ乳ヨキアリハ徑水アルハ上ニテウズ血ガ逆ナリ
下ハ乳ノ為ノ為ナリ乳ノ能出ル者ハ多ク在リアルモノナリ許出乳部 玉生
后程ニテウズ乳在スルハ曲リ惡キ時分ニ出ル故ナリ事身不遂ニ成テ死スル

モアルナリ

産后下リ物ハ二十日斗リモスル大抵濃キ物ニ非スシテムスク黄けノ様ノモノ
下ル者ナリ歟ハ平生ナレトモ二十日時ガモヤリ血ノ下ル者ナリ其レハ不順ニテノボセ
タリ熱スル様ノ一モアリ瘦スル一モ出来ルナリ候シ三十日ノ間ハサシ
テ血下ル氏カマヌ一ナリ四五日モ赤血ノ下ル者モアリソレハ瘦ル一アツテ
コキ一ニ非ス

産后脱血シテ日シ徑レバナラフ又者ナリ由味根實數ナドヲマルナリ全体ニシ
カタノナキ一ナリ

産后子宮ハ大抵七八日時分ハ臍下寸程ニルナリ十四五日ニ上リ寸ナリニ
ナリテ右ノ股ノツケ根ノ処ニ入ナリ其時ニサシキカサレル間ニ又黄けノ
様ノ物カサシツ下ルモノナリ何モナシサワラ又極ニナルト最早平生ナリツテ
下リ物ハ止ムナリ物ノ有無ハ子宮ノガサナリ次第ニ知レル又多ク
此ヲ見テ塊ナトモ産后ニ通シ出来ルモノニ非ス可心得ナリ下リ物
ノ止ムモノハ塊アレ氏又ハ熱ト餘症アルベキナリ凡止ムハ下リ又黄け
ノ様ノ物下ルハ子忌ニ十日モ有ナリ

産后三十日ヲ経テハウツリト血ノ収ル者ニ三十日ヲ子忌ト云フソレヲ
経テハ収ラマモノナリ多クノ病リシヨリ内産タルナリ産后ハ限リナシ子忌
男子ハニエ日女子ハ三十二日ニ至テ初メ神ニ詣ルナリ小兒ノ髪ナレルニ六日

男三子百

女子三子百

產后足腫痛

或腰痛

必瘦或身大

痛奇忍其痛

治海陰外傷

多用二一

父レ云ニワレラ二七夜伝ナリ死タルハセロト云三子ノハカセナリ六日七
スル故ニカセナリ四子ナリ二日ハソノ翌日ミテ忌明けナリ
三子ノ子ニ子ナリ女子ハ三十二日スルハアトヨリスルノ意ナリ
死ニハ三子ト云
二七十四ナリ

產后不固身体ノ不遂ニナルヲアル者ナリ卒中凡ハチカキモトリ氣ルモノナリ
其後置テモ大抵血ツテ無フノ者モマナリ或ハ又妊娠シ分娩シテモ不遂
血ニ又者ノ血トモ文字ナド書ク極ノハ出来ヌナリ其内足ハ
直レモチカ直ラヌナリ大形カ不遂ナリ先胎子剖ツテ可シ中凡
治ト曰様ニスルナリ不遂ノ精神ノウツトリスルハ直ニ死スナリ精氣
甘メカニカシ色レ子ニ直ルノ其発スルハ卒然トオコリ中凡ハチカ大形
言フハ出来ナリ口モ得ヌナリモナリ先年ハ凡ハチ類也病モ中凡モ
極ナリ何レモ別子ハ無キナリ病モ血不足カラ発リ只老ヌトナリ
トノ別ニ名モ代レ氏曰義ナリ老人ハ血モ自ラ枯ル者故ニ身タケ
ハ行トカ又ナリ產后ニ舌ノマバヌ不語ノナリ失張不遂ノ輕キナリ產
后ニモ病ヲ引ハリ口モ引ケテ云フナリ又者モ凡ナリ血リ易シ沈者
又ナリ湯サトミナリ血ナリ

產后足痛ニテ伸ヌナリ是ハ椅子ナト坐ス故ニ然リ別ニ病アルニ
非スニ二年モ直ヌナリ有リ此ハ業デモ行ヌ更レハ七日ノ間日ニ二度程

当飯ニ行ニ西ニ入リ腰陽ヲサスルカ善キナリナシツテ腎ヲマカ
リメ位ニクル位ニ陽カ有トヨキナリ大抵深サ二尺位ナリ日ニ三度程暫
ク坐メ居ルナリ水多キハ蒸々トメ長ク坐メ居ラレ又ナリ陽カ弱上ニシ
ル位ニスルカ善キナリ熱アルニハ極メ不可レ積タ一年ヤ半年ハ積置ナ
モ構ワヌナリ熱サヤナリ待テ陽陰スナリ一二年ヲ待テ直ラヌ
其ハ茶クサクサヨロシカラス且ツ日ニ三度モ佐スルカナリ又ナリ故ニ冬
ニ用エシ又痛ノアル様ノ病ニテ致スハ茶セテハ直ラヌ又ハ一且ハ何
事モナシ然レヨリ経テ痛シヒレ様ニナリ橋子直ニ足ニ伸ヌナ
ド云者ニハ入陽サスヘシ本外ヨリシタ者故ニ直ルナリ内ヨリ起
ル病ナラバ茶割ナラデハ愈難シ立休ニ産后ハ足ノ立ヌア人者ナレ
直ニナリ易キナリ産后腰ノ痺レムナリ積置テモ直ル者ナリ妊
中ニモマアリ妊スル度ニ腰ノヌケルナリ又左服痛スルナリ産后ニ
至リテモ急ニ直ラヌナリ病ノ治トモシ血ウサバク極ニスヘシ本年モ前又
ナリ産后無事ナレバヨリナリナリ俗ス可シナシモ病アレハ愈ルナリ産スル
ハナラヌ又ハ六日メ位ニ及ナト産モ死スル者アリ可戒也ハ六日位ニ及
熱アル者故ニ愈キナリ毎晝ニ一試カヨキナリ又ナド汗多ク出テ其
汗クワカ又ト気カイラヘシ又急ニ死スルナリ所謂紫斑ナト云スルナ
モ治后ニアル者ナリ又時多シ急ニ死スルナリ有ナリ冷水ヲ喫キカケ

上部腫
產后上部腫
可急下
喘急
產前以未喘
急者爲產
死產前
喘者爲惡候

テ血元フモアリ大熱證証シテ産スル者アリ一陰部被リ鼻ニ塞ス故
ニ産スルアリ又故ニ久ク時ハ無キナリ其形産ノ様ニ成リ黒クナリ引コ
ニテ死スルナリ自然ニ産班スルヲモアレ氏大抵産後ナリ母ヲ産前ニ産
ナリ傷シ安ク産スルハ死スルナリ流リ産後ニ熱ナリテ而テ産後ニ熱
アリ水結ノ様ナリ水結ヲ見ル如クナリ是モ亦時ナリテ産前ハ俗
スルヲ捕ハヌアリ喘急ナリモ若シカラス又産前ニ鄭重治フヲ戒メル其
時ニ當リ振リ浴スルヲ流行シ大ニ害アル故ニ此疾キニシテ戒ルナリ今
時ハ危程ニ浴セス故ニ何モ戒メス氏可ナリ然レ其ニ産後ノ浴ハ至
恐ルナリ戒慎スベシ
產后ニ上部大腫スルナリ面部カニ寸モ張出ルヤウナリ有レ急ニ下
カヲキナリナリナリ愈ニ此疾ク明ニテ寒ク程ニ至ル死ス
產后声出スレテ咳嗽スル者ハ咳スル毎ニ遺尿スルナリ至テ長ク連リ而レ
モノナリ產后ニ喘急スルアリ產前ヨリ喘急アルハ產後ニモ必ズ死スル
ナリ無ナリ極テモ速ニ死スルナリ產后テモ不問喘急スルト無ナリナ
レハ喘急スベキニ病アルヲスルハ隨分アルベキナリ氏思ヒカケナク喘
ルハ惡候ナリ
產后前氏ニ舌爛レ小ナキ物ヲ生シテ痛クナリ一血液枯ルニ因テカ
アリ常ニモ小産スルノカタマ々々本産スルニ具代リニ母カアトニテ犯ス産ク

嫌産

禁接

禁房

石羔

禁禁矢

病者之ヲノカニ血ヲ取レテ母ヲ損シテ養足ラヌ故ナリ本ト子ヲ養
 育スル程過カニ多シ故テ産スルニワレカメマ々子ノ生レルハ母ニハ
 猶理ノヨクナリテカラト云ヘ氏實ハアトモ母ヲ害フアルナリ
 氣ヲ付シテ及テ失張小産スルト母ノ為ニ害ナリ口申カ思カトソ不足
 シテ無キ子ノ健カサカ生レ氏程母ノ為ニ害ナリ
 産后ニ門外ニ出ルヲ嫌フ者アリ息ヲフレク思ヒ恐レコク思ヒ上ツ
 アリ何レ病ノアル等ノ人ニアルナリ
 産后ハ腹ヲ接スハ悪キナリ接腹ハ前ニ取ル后ニ安リ接腹シテワレカ
 ラ悪クナルアルナリ
 産中ハ閨房モサシテ構ハ子氏産后ハ全体ニ事ヲ養ムルカ宜キナリ母ノ
 為ニ構ハ子氏子ノ為ニ悪キナリ當時ハ大形血ヲ下リ上メバ入房スルナレ
 氏全体ハ血カ悪クナリ子ノ病ヲ生スルナリ有ナリ故ニ乳母ノ乳ハ
 コレナキ故ニ乳カ悪クナラヌナリ何レ下ニ血回リ勝ニアルト自然ニ血水
 モ早ク回リ出ルアル者ナリ心得ヘシ
 順産小産勿論産胎庄皆モ養ヒスルアルスベテ産后ハ石羔カキ
 灸ハ産中ニ宜シカラズ腰サドハカニ悪キナリ其内ニ重板ハ構ハ子氏ナ
 ヌナリ灸位カ胎ニサワル者ハナケレ其灸ニ由テ血動クト又ガラ胎
 ニ及ブアルナリ灸位テ胎ニサワル位ナラバトモ役ニタツ子氏非ズ自然

自利帶下
痛者為霍

下利腹滿

產前下利者
及產後下利
必不安為死
候

下利

モ下利位ノ一ナリ母ノ血カ動キテカラテモスハレ又可慎ナリ產後ハ三
十日モ無難ニミテバ構ウヌナリ血ノ動ク多ク者ハ欠スルト血動キ
テ惡キナリ佐ニハ六十四ヲ經テ欠セヌト血ハ又レハ構ハス大抵欠
位ハカマハ子氏大ニ欠ヌルトイヨクナリ物多キナリ
產後下スハ宜シカラズ秘腹スルモ又下良トス若シ自下利スル者ハ死
スルナリ附子割ナドハ正者ナリ其内腹痛ナリ帶下ナリ又善キハ死
免カル一モアリ其腹痛アル者ハ下ルト云ハ清亮スル程ノ一ハナキナリ
シノ向ハ持子タヌル腹脹滿ニ下利スル者アリ惡候ハ死スル者ナリ全体
ハ下利ナリ腹痛モ亦付位ニ瘦ルカ順ナリ其不相ノ一有ハ何テモ惡キ
アルナリタトハ勞瘵ナトリ熱ナリナカフ食味捨別不食古胎下ハ及テ無
ナル極メ差違ヌスル処ナリ產前カラ下利シテ口中古サド赤クツブ
タトメ食モ味ナクノ目ニ度モ下ルアリ其サトハ產後ハ下利不止死ニ云ナリ
左胎ノ如キ者カ此彼レヨミ出ヌルハ必死ナリレ産前ハ死セヌナリ生
ルト直ニ死スルナリコレハ石重カヨナリ附子サドヤルト腹ハ極ノ一城ア惡
キナリ其右ニ塩サドテモシムハ無キ者ナリ產後ニ余在ナク水浮スルモノ
ナリ食モ呆アツテ但体カ瘦ルモノミテ氣カ惡シカラズ腹々ニ瘦ル者ナ
リ其ハ上ニ云運リ直レハ腹痛モノニ水浮スルハ必死ニ案割ヨリ查
禁スルカヨキナリ

熱利者禁
割無熱而
下者附割
有熱者無
禁利者禁

產前後ノ下利ハ多クハ熱利ナリ血虛スルホト増熱ナリ熱ニ下利ナラハ
禁割割可シ熱ナキハ附子割附子理中湯ヲ与フシ其利ハアルヘカ
ラ大熱アリテ腹ノハル者割ハ更候ナリ熱ナキハ直ニ下利ハ食ヲ
減スルヲ禁ミ熱アルハ食ハ更熱ナキハ飯ヲ食難ニ氣ヲ付テタタノ食ス
ベカラス遙々瘦テ死ニ至ルナリ安中又加附子真武湯ノ多ク投スベシ
其極ノ人ハ必水カタル者前ニ玄白湯ヲ与フシ熱アリテ強ニ下利スル死ナリ
舌ニ白スナキト白ナキ者石炭ノ多ク急ニ下ニ飯ヲ食ベカ下利止ス
過食故ナリ食ヲ減スルカ宜シ其食ヲ減スルノ法ハ世ニモ皆拜ノ而
用ル位ニ日ニ數回日下限リ一度ニ飽マシモ食ヲ有ル故役モ何モタマハ其
ヨリハ度ニ割ツテ強テ食セシムル善ナリ小キ茶碗カウマナリ縦ニニ割テ食
一杯ノミテコラ其代リニ日ニ數度モ進ムヘシ飢ヲ覺ヘタスバリ一割ツテ食
フナリたスバ其分量ハ數回日下限ラズシテ病人相応ニ食フ故ニ何モ
モ害ナシ毎食ノ多ク少クナリ病ノ劇易ヲ知ル者ハ能ク亮ラシムル
故ニ下利止ムナリナキモ直リカ子ナリ者ナリ此減食ノ法直ニナリ其善ナリ
モ飯食ノ法ハ決テ直ル者ナキナス水腫ノ變脚氣衝心等症ナリ可カラズ
減カスベシ彼ノ日ニ何食目トキメテハ日ニヨツテハ餘リナリ可シ足ラヌ
モアルナリ甚ツテ又仕方ナリ其度ニ食事ヲ供スルヲ厭フナリ一時又食ス
カラズ大ニ誤ルナリナリ一時勞ラ厭フナリ身ヲ生ラ誤ルナリナリ后心腸嘆

産后五六日成テ硬キ大便通スルカヨキ其レ能ク如ク通スル方順ニ早ク
下ルベシモ作ニ下リサスレハ惡キト思ヘ氏下ニキ症アリテ下ス者ハ何
モカマハヌナリ其テモ利遂ニ止ムト云ニ至ルト是モ惡キナリ
産后小便自利スルハ皆初中ヨリ通スル者ニテ尿完ヨリハホメ何レモ許
ルベシ産后モアワテ陰中ニ通ヌルヤ難産産后自利ト因テニツアリ自利
モ止マヌニ至テハ惡キナリ共ハ味元ニテ可ナリ先年石淋アリ陰中ヨリ火ウ
瓜ニテカキトリシニ口中ニ生スル塩ト同物ナリ又或ハ痛カ咽ヨリ火止時塩
カタタリタルヲアリ成テモ同物ナリ
産后三四日程ハ無難ニモ用捨シテ置カテ言ナリ免角仕事ラレテガ
ガアレキナリニテハ強テ何モ氣マミテ物ヲトコラヌカヨキ不図ヌルト其テ
癖ツキテ終身産ト成テアルモアリ隨分大加無事ニスルカヨキナリ
「ニテ終身ノ福ヲ被ル」マアル者然ラバトテ強ニ似シタリ何モセヌ
安坐飽食スルハ宜カラス只常ニ従フベシ

小産

小産ト胎血ト會ラヌ「ア」リ因ノ足テ形ニ成テヤルト胎分レモ未ニカ時ガ
知レヌ時分ニ下ルト血モ胎モ分ラヌ若モ小産ナラハ先レハ頻ニ痛メ胎腹
アル間ハ痛ナリ別ニ血ヨケイ下ル胎ノ下ルニテ痛ナリ胎血ハ痛サシメ
トヒ痛ムトモアレシマナリ其痛甚シキトヤレヌムトミテ胎ノ下フ又ハ知レナリ

大産ノ痛ハ同ハタ胎ノ生ナリ三月位テモハヤ形ノ方ルヲモテリ脱血
ハ初下ル氏心耳鳴ナリ胎ハ最初六耳ナラズニ段々ト下ルト産ミハ鳴ル
アルナリ脱血ハ清ニシテ下ル故ニ耳カ鳴ナリ其当出ハ右ノ候ニテ知レ厄若毎手
ニ如此ナルナリ以ハ何ヤト問フハ又候法アリ其胎ハ其下リ物ハ何ヨリテ
下リシヤト問ヘシヨリ経テモサツ其ナリ極ノ物ノ二十四モ矢張下
ル此小産ナリ脱血ハ五ニ止ニテワツカセ八四位ニ直ルナリ小産ハ
本産在ト極ナリ物カ條ニテアレナリ脱血ハ本トニコウルモノ塊
ニナルヘキカ下ル故ニ疾ク愈メ故ニ胎ノ小産スルヨリハ五ニテヨキ
方ナリ小産ハ有ヘキ者下ル故ニ厄キナレハ二三月位ノ処テハ大抵
死ニ至ル者ニアラズ七月位ノハ危キナリ平生産后テモ耳ノ鳴
ルトハ稀ニアル者一回カ立テ上セテカラスク直ラ又ナリ
小産ノ胎ヲ見ントセハ其血ノ下ル内ニ在テ至テ知レ産ヤモノ血ト別
ツナキ者其中心ニ胎ハナシ桃花色カリテ何トヤク血ノ色トハ違
ニ光沢モアル様ニ見ユルニ胎ノ血ク又メリテ落サテハ矢張血ト同ナリ
見ユルナリ梅接ホトアル者ミナクカタマリテ有ル者又メリテ取テ
其別又可シタスレハ手足モワレタナリ手モ針ホト有指カワロウテ
アルナリ目ト口トカヨク別ナリ男サカ知レヌクイ者ナリ胎衣ヲ胃リテ
アルハ大キク危シルナリ又胎衣別ニアルハ矢張血ト堅リト別ナリナレ

三月下着児弱
ナリニ七月下着
母表は是ナリ

自ら筋アル様ナルハ是大率程大キナリ六月ニナルト俗人カミテモ能
知レル位ニナリ四月頃ミテ二向小サク六月頃ヨリ卒ニ大ニナル者ナリ
七月ハ髪ヲ生シ九月ハ何モ能備ル只肉ノ付又近ナリ十月ハ肉ヲ
生シ大ニナリ又多産ニモ三月時分ニ下ルト六月七月時分ニ下ルト
ナリニ四月時分ニ下ルハ児弱キ故之故又孕ニテ本産スルナリモアリ
六七十月時分ニ下ルハ母ノ食食ウスモ故ナリニ四月頃迄ハ小サ
キ故ニ食力不足モ保持スレセ四月頃ニモナルト大率大ニル故ニ食力足
又エ下ルナリ故ニ毎胎クセニナリ下ルナリ七月ナラバ七月頃ケルナリ
又九月タケケル母ノ食力アルナリニ十月分ニ下ル又故ニイッテ其月主
ルト多産スルナリ子ノ弱キ方ハ早クモ下リ母ノ力ハ又エ二再
ヒメニハ全ク生ルナリモアラン其母ノ弱キ方ハ不斗ナリモ保ナリ
子生ルト必母ニ病ヲ生スルナリ養フトスル故ナリ妊中カラ産ミ
アセキ者アリ必口中カラ子ニカドユカ、悪キナリ養フ是ナリ子ノ
ハ小サクナリテ多産スレバ血モ又多ク下ラヌナリ卒ニ多産スルハ血又ヨ
ケイ下ル者ニお撲倒レシテ卒ニ胎ヲナメリ子ナキ帯ル妊クニ重キヲ
覺ヘル子ノ死シテ下ニサガルナリ多産下リ小産随胎死ハ大便ハナク
又下利スル様ニ悪クナル者ナリ死ニ臨テ上ニセリト下シテ
下ラヌ様ニナルハカサレ死シハ格段ノナリメトニお死スル死下割

惡阻不大使

胎破水後
經二三日而小
產者破水而
直一經是胎
性未定數
煩渴之症ア

力蜜煎導ノ多ミヲ出スヘキナリ。雖中ニハ不固大使セズレテ一向通セヌ
フヘアリ。如何振シメモ通セズ死スルナリ。然レモ多ク皆秘結スルモノ
ナリ。通シ難キ者又產后血ノ枯レル様ノ人モ不大使ア。ナリソレハ内ニ
潤ナキユヘ無極枯レテ通セヌナリ。下利ノ丸ヲヤルヘシメツタニ通スル
者ニ非ヌタト通スルハヨケイハ通セヌ具様ノ者カ自下利スルナリ。ハ
惡キナリ。ニ三四月ニ至ル形ヲナス者アリ。又六七九月ニ至ル形ヲナス者アリ
一例ニ云レヌ三四月ニ至ル形ヲナス者アリ。時ヨルベシ。又七月後下利ト
形ヲナス者ナレハ一向ニ形ナキ者アリ。胎衣アツテ子ノ無キアリ。葛藤
ミル様ノ物アリ。其様ナモノ、腹ハツク子タルモノ、極ニ硬キ腹常
ノ例ノ通りニ大キナラヌ又者ハ大形アリキナリ。痛セテノ腹減セ
ハ事ナシ

隨胎

隨胎ハ水下リテ三四モ回アツテ分娩スル者ナリ。從ヒ破水セサルニ至テ
ハ四五モ回アルナリ。破水シテカヲ見非一日カニヨリ終ル者ハ產ハ破水
スルト直ニ死スル者ナリ。是ハ保ヲ得レテ下ル故ナリ。隨胎ノ症ニ寒
熱往來寒戰煩渴スルナリ。易產ト云ハタ產前ニ惡寒スル者ナ
リ。難產ハ產后ニ至モアルナリ。隨胎ハ惡シク云又者ハ小產下云テ
僞ル或ハ一向ニ症ヲ云ハズニ見セル者ナリ。或ハ時疫ト云テ僞ルモノア

リ其故ニ是ヲハ向フニ初ニ寒ケ有ヤ否ヤ向ニ有ト云ハ其故ニ熱アリ
ヤト向有ト云ハ即隨胎ナリ易産テモ女ハ寒アルナリ易ケルハ産
厄ニモ無キトモナリ或腹痛或面赤色或陰門真氣甚ナリ或ナド
利ス易ケルハ否セス及テ便スルナリ下リ物ノ多キハヨキニ大抵サレバ
カ下ラ又故ニ如此症ヲ有スルニ其下リ物色土ノ如シ是熱因テ腐爛
スル故ナリ其腹痛スルニ按之ハ凝血アリテ腫ナリハル痛ナリ凝
アル故ニ然リハケシキ者ハ胸ノ方ニ班点ヲ有スルニ血毒上攻スル故ナリ
極更ニ症ハ胸サキガ脹テサシムモアリ至テ進ナリ又劇ニエテツ
サ腹ノ凝大ニツツテ腹痛シ膿潰シ腹ニ穴アリク者ハ必前ニ痛ハ勿論
他症ニアツテ左ニ膿潰スルニ此症多クハ死スルニ然レバ治スルモナリ
ヨリ短レハ治スルコトアルナリ隨胎后全肝腹痛アルハ要ニ腹痛
ナキハ善候ノヨリ短テ凝テ腹痛シ余症ナキハ当段ラツキ色ニ濁
ニ枚シテ蒸スヘシ前ニ云通りノ症ニ配氣ノ有テ至テ更候ナリ必定死ス
ルニ先大抵桃仁湯氣加石大柴胡加石硝小柴胡加石ノ後ニテ石硝ハ
是非用ニハシ何レ氏下スカキテ隨胎后ハ下シテ下利アリテモ構ハヌ
ナリ本下利スル氏下割テ用ユルニ全体秘スル者ニ秘スル者ハヨキニシ
下ルハ熱盛ニシテ逐ナリ故ニ下スヘシ又隨胎前ノ如ク治ニテモ后肺危
如クナリ咳嗽シテ羸瘦スルニ多クハ治スル者ノヨリ短サハ此症

ナキ大便ヨリ膿ノ如キ者下リアリ腸癌ト曰ヒコレモ直ラ下スル之惣
テ隨胎ハ下リ物ナシハ治シ易シト曰ヒ内ニ多クハ死スル者其ノ過サ
ヘスハ治シ易シ刺疾ノ様成テ下リ愈ルモアリ又小産ハ面赤キ
者ナキナシツノ頭痛腹痛着ナリ此直ニサシル之隨胎ハ陰内具キハ
亦タ産セス内カラ臭キ者ナリ其臭キ内ニヨリ經ハ腐香ニアリ他
産ハヨリ經子ハ臭氣ハナキナリ順産ハ下リ物カ融ク下ルナリ
隨胎ハ下リ物ナシタルト喜ナリ然レハ大抵カ下ラヌナリ又ナリ又ナリ
ノ疑リハ子焦カ刺ハ管カハシレ子ハ一向ニ痛ミナリチノサレヌナリ
リ前ニ云通り隨胎ハ産后ニモ痛ツコトナリ小産ハ又隨胎后ハ
大便ニ毎カ血ノ下ルアリ前産ノミカウ出ルモアリ小産ハ無キモノナ
リ小産后ハ血ナシ下リテ疑ナク隨胎后ノ当坐ハ出カ子后ニハ
二前後カヨリ色ヲ変シテ下ル者ナリ愈ン候ナリ小産ハ若シテ子焦
ノナキサワル様ノ一ハナシセ月位モナルト女々凝リハアレハ大キナキナリ
隨胎后ハタヌ凝リアリテ思キナリソレハ血ヲ腫ル故ナリ最初ハ中
央ニアルカノ經ルト右ニヨルナリ大抵トシテモ右ノ方ヨリナリ
ナキナリ隨胎ハ思ハルト上夜短氣ハ胎ニ迫ルナリナキナリハ寒ヲ熱
ハゲシカラス小産ハ固ヨリイツテモ熱スル様ノ一ハナキナリ隨胎スルハ

木ノ尖ニ系リ包ミテアル故ニ佛ツク者ニ非ス。麤者番ナトアルヲハ、
驟ニ生ルナラシメ胎ハ佛ツカシ故ニ膜クサカフ其マ、生レル者アリ破水
シテ生ルモアリ。五月胎分ハ未タ小キ故ニ必轉倒シテ下ニ出ルナリ
大方皆逆ナリヲ云タル故ニ母ノ息ミテカシマス故ニ横逆産
ミナルモ内義ニ足ハ出ヨキユヘニ先其ヨリ出ルナリ。横産ヲ逆ニ足ヨリ
出スモ曰ミ我ニセ月位ニモナルト自由ニナラフ故ニ其極ニ轉逆スル
ハ無キナリ。其月足ラヌ内ニ轉動スル故ニ子カヘリノ説ナド起ルナリ。
墮胎ノ血上逆セシハ驚アタリニタマリテ曲又アリ。其ハ又下ニテ
モ下リテ善キ方ナレバ其血力出スノ腰ナメリ。腰潰レテ出ル者
モアルナリ。ソレニテ死リ免レ生ル者モアリ。又后妊娠スル極ノ一モア
リ。たスレハ蘭人ノ所謂卵有ト云モ方ニ膿潰シタラハ卵ニタラ
ル。二再ニ産云ハスルト又出来ル上云ハ即其親ノ赤メル一不吉ヲ自明
全体順行ト其血下リテ上行ナク行クハ無一ナリ。子バカリ下リテ其
血上逆スルト前ニ云通り危症ヲ生ス。
墮胎后ニ年ヲ経テ妊娠スルヲアリテ其テモナトナク悪キ一ツツテ血力
ラズ墮胎ノ禍亦大哉噫。
墮胎后ハ善キ極テモ油斷ハナラヌ者ナリ。下ニ逆シタルヲアル。叱氣ハ甚ナリ
版ナド疑里寒熱スルナリ。振ノアルハ即チ熱ノヨキナリ。コレモ服ヲ示和ニ

張り乳ナドノヨク張テ出ル者ハ若候ナリナシテモ乳けノ出位ハ能循
理スル所アルナリ乳ヲツクミ然レ墮胎厄ハ了テ了マカス然トモ要クナル
アルナリ墮胎ハ兎角人ノカクシテ小産シヤトス偽リナリ其時ニハイツレ
ニ是ハ小産ナリモ通リト違ヒ小産ナラハ此様ノ症ハナシ若血塊ナドアツテ
其下ス為ニ茶ヲ飲ミセマヤト回可シソレテモ出ヌキハ此ハ小産ニ非
症カ異ナリ塊ヲ下ス茶ヲモ此様ニナリナリ若血塊ナドアツテ茶ハア
ラヌヤ若シテハ治療カ大ニ異ナルニ其毒ヲ取ル茶ヲヤト死ル者
ナリト云ヘハ向ニモ恐レラハモナリ若シテ又ハ家人ニ尋ヌ又ハ近内
ニ三四前ニ外ニ行バセヌカト向ヘシ其ヨリ寒ケラフカラ初起ノ
リ回フヘシ又向ニヨリ直ニ言レヌ又外アリ其代ハ家人ニテハ家婢ニテ
モカノニ三四前ニ出タフカラ出タト云ヘハ其ニ付テハ症ヲ押セハ此方
ノ云フト合スレハ必定ス者ナリセ月頃カラハ墮胎シテモ不産ノ通
氣故ニ大方四五月頃ニテ茶スル者ナリ何モ四五七内ニツレモ治ス
別チハナキナリ此ハ五六月位ニハ子宮カ正面ニムク六七月ニテ下
マカリカケルト益近クナルニ六七月カ子宮カ近クナルニ七
ハ九月ニナルトロミ又様ニ指トカ又様ニ成者メリレカラ生ル
ト戻リシテ子宮カ正面ニ向テリテ子宮カ出產スルナリハ四五
時分ガ指ヌキヤ代ニ早クサス程ヨケレ氏ニ内三内テハ姓ヤラ何ヤラハカラ

又故ニ得サリ又ナリ別リサスルハ早クスルホトヨキニ七月頃ニナルト子宮内ニ
カマカル故ナリ又モリノ或ハ妊娠ニナリサシテモスルヲモリシレハ及テハ産ホ
トハサハス又モリ何レアサキニサシテモスルヲモリシレハ及テハ産ホ
ハイヨキハ六通ニ下ルサレハ横ノ方ニアタリヨクニ心セ又ニ引ト四リハ
ナルヲアルサレカシテカク大抵ニ千所位ニモスル者モモリハ相心セ又
ガルヨリ外ハサキニ后ニハ腐敗ニナリ月サトノアルモアリハ相心セ又
茶ヲヤツルモ出ルモノモ出ス其内セ月モ月ヲ経レハ指ニテ子宮ヲ探リ
出サクルハ月々又内ハ向ハサキニ見ヘ又ニ且ホク産セ又ニニ子
宮内カ又故ニ子カ入ラヌ之胞衣ヲ床トハ異ニ甚シキヲ子ハ十日
以上モ出ヌ一可戒ヲ胎スルノニ茶ヲハユカ又サ子或ハアラヌ或ハ水銀ナラ
服スレハ脱スルト血決モナスル者モナラヌ老茶ヲヲ胎スルハ位ノ子
ノ自然ニモ胎スルナリ又アラメ杯ハ血ヲ動ス者故ニ固キクノモ
アルキヤニ其レトテモ胎ヲ傷ルハ非ス血ヲ動スモノヲヤレハ血ノ血動ク
故ニシカク胎ニ及フ之指茶ノ法他方或ハ午膳サトウ用ニ京師ニハ權ナリ
ヤニサシ茶ヲ飲ミテクハクハ其内ニ茶ニテ胎カ脱スルナリ腐敗ナリ
トヘルトニユハ子位ニサシテモ腐敗スルニ其外胎カ脱スルナリ腐敗ナリ
ノ一何リ胎ニタカシテモ作同ニ川奥ヨリニモサ子ヲイムノ多クハ知ルサ
ニ非ス今ハ誤リ認テモナリニモサ具故ニ知ラズサ子ハカクシト

又云、子ノ物ヲカラヌト云フ。是ニテ云々幸ニ幸烈ノ物故ニ付胎ヲ
脱スル上ハ川鼻ハ川流ニ居ル故ニ流レ上テ忘ミテナク又チ之類ハ血ヲ
動スルノ嫌フデハ血要近モ日様ニ云テ食マツテ其受所シ浪花ナトハ一
セヨ内ニ必ズ動カサヘリ皆ナ理ヲ以テス一故ニ実一ハワレルナリ
世上此後亦不為ナラ随胎ノバケルホ大カタ子一時ニ生レテナリ
又不回ノコルマアリ而三人モ此方是アル大方崩漏ノ様成テ聖年
直ニ又ナリ英ノ崩漏ノ症在アリテ是非顔モモ變ジクイタク
服系ニテ直ウ又年経ノ崩漏ニテサテ衰へモセスト云カ即
本病版ヨリス者ニ非ス世ノ医氣ヲ付ヌヤハリ胎ヲ去セシメテ何日
コレモ直ウ又ナリ氣ヲ付クへ或ハ腰や股ノアタリ腫物ヲオコエテ
其ヨリ出ルモノアリナレ氏大方肩サハリテ出難キノ事ハ直ニ腐リ
テモ木ハイウマデモアン故ニ崩漏ノ様ナンノ其残ルハダ子宮口ノ
下ニ出ルモノナリ子ノアン内ハ子宮強テアレ氏胎力出ントセム故ニ
段々セバム也其ノサキ方六端ヲシクハリテアレ故ニ方ノ如カ子宮
指ヲ二三歩モ出ルナリ指ヲ看視フ指サバル者其時子宮口ヨリ
指ヲ入テ瓜ミテ其出カハ方送り出ス様ニスナリサシテモ出難キ月
サワリテ出ヌナリ其時ニ其出カハル如ク上ヘアケル様ニスルト子宮口六
ニ上ニアカレ其ヨリ指ヲハサミ引出ス成ハ出ルナリ出ル寸ハ崩漏

モ直ニ止ミ平愈スルナリ本カウハ腹ノ痛ミヲハナキ故ニ死スル者ハアラズ
死スル内ニアルハ佛ヲ養フ生スル極ニ成ミ若クハ方ニユクト死
スレバ大抵サキニ宛マル故ニ子息ロニ出ル尾臣骨ノ方ニ向テアル者ナ
リ本ノ長サ可計

脱血

崩漏

脱血易産ニクミテ産産ハ大抵無キナリ産産ハ本ニナリ胎故ニ且産
産シテヒミ入ル故ニ其マ、血ノミナリナト見産産ノ死胎ナト成テモ血ノ
下ルハ全体サキナリ人ニヨリ女レモ下ラヌアリ微ニ下ル民易産ヨリ
サレ血腐リテ産セ又内ニホトト赤小豆ノ如キ穢臭下ル者ナリ皆血
ノ臭腐スルナリ子モクサル者ナリ生レハ丑モ亦死ス其死胎ニテモ
ノナキモ出産死ス女レニテモ血ノ下ル方カマナリ死胎ニテモ
ノ臭アリ産前腹ノ鳴ル者又出産ニ水ノ如キ穢敗ノ物前陰トナ
ク尿道トナクホトト腹鳴シテ下リテ止ヌ者カセ死スナリ産産
産心下カ具マミテ減セヌト西レチナトナリ接スルヲ西ムト下ヌキナ
アルハ善ナリ又子息ノノミナシテ残テ上ノ方ノスクハ即チサキニ脱衣ニ出
ヌ内ニ血ノ漏ルハ蓋シ易産アルモナリ又子ノオルハハツニテ精血ガ
通フテアル内ニ子ニ出ル故ニ崩漏シテ止ヌト正血脱シテ死スルニ産
前チカカタマリカ下ルモアリ又薄キカ下ルヲモアリ格別ニ害ニナラフ

帯下血帯白
赤帯臭者可
愈也若臭ヲ
五心煩熱而
勞瘵狀發モ
不能免也
必矣

又之全体胎衣ノ上ニアル者ニテ産后ニ出ヘキ血カ先出ル故ニ胎血宜シカ
ラスカ息ガ強クナルト止去者ニ是ハ何モ難産ニ成ルハサキナリ本
内ノ子張りニテ保衛シテ女レモ通セサシム之其レカサシテモ子カ弱
ト其衛ヲ嚴シクセ又故ニサレワ漏レナリ倚シ内ニカハラヌヲ故ニ死ス
ル程ノ一ハ無キナリ内赤小豆汁ノ如キ湯水下ル者死胎ニテ膜内
ノ清水腐シテ赤白鮮ク漬物ノ水ヲ見ル様ノ下ルアリ長引ナリ血
ニ出テ其ハ至テ山候ナリ本ヨリ婦人面色惣体ノ趣カ一見テモ大ニ異ナ
ル者ナリ脱血ハ葛餅ヨミル様ノモノニ産産ニ其様ノ者下レト鳥
ノトリノ様ナ赤堅キ者下ルナリ
小産后ニ内ニ月位イノハ産后ニモ腹ニサシキ子息故ナキナリ帯下
ハ中位ヨリ始ルト終身ノ患ナリ赤キハカリハ又ヨケレ厄白ヲ帯ル様ニサ
ルト血ニサフ又故ニ赤カキナリ産后ハ凡テ血物ノ下ル様ニナルト死ス
ルナリ又女ニ年ノハ道レナリ血経閉ル如ク膠文四條ノサトヤルハ
ナリ愈ルト其厄ニ強スルアリ下血便血ハ大抵痛フナリハサレハ陰
ノサレ下ルノ故ナリ血レヨキハサレハサレハサレハサレハサレハサレハ
吐衄ハ産前ナレハサレハサレハサレハサレハサレハサレハサレハ
レテモセ月ニナルトサレハサレハサレハサレハサレハサレハサレハ

逆氣ノスカタ故ア人者之血血下血ナモ甚クナント又又産
后ハサレヤウラモ宣ニカラス振病胎死必下血ト云此其モヤストハ
云レ又ナリ併シ随分下血スルヲアルヘキナリ

經閉

産后ニ年ナキホド經水ナキハ煩之其レ死ヲ數サ子ハ血曲ル様ニ之經
水ノ早クムルハ要キナリ知ラ數ハ内ニ通スルヲモアルレ其ハカシツ
来タニニ内ナラヌメ妊スルヲマアル之又經水ナクノ直ニ妊スルモ
アルナリ申斷スヘカラス
女子十五歳經水アル者年ナリ過テ曲ル者有弱ク然アルナリ終身
經水ノ無キ者アリ要候ナリ多クハ長と目セ又者之蓋シ病アリ
通セザル者アリ其症ナリ是ヲ攻ムヘキナリ多クハ妊娠セ又ナリ
レ又孕ムヘキモアル者之婦人病ナク經水ナキ者ハ皆妊娠ナリリレモ
經水血ノトコフル症ニ通セ又ハ隨分ナリ前ナリ何モ別ニ要候ハ
云レ又之勞瘵ノ後多クハ肉スル者ナリ必ス悪シ如何ト云内ニ經水ナク来ル
程ノ循環ナラ衰ヘタル処ナリナリ惣体婦人ニ出ヘキ經水ナキハナリ倚事
ナリ要キナリ之毎月ナリツサへ通サスハ長ナキ者ナリ亦タ嫁セリ
娘ノ經内スルヲアル肥満スル者ハ構ヌナリ其ハ經水ニ曲ルヘキカ皆肉
ニ付故ニサシテ構ヒハナキ自身ニ要キナリアル之若瘦ラ經水

来又ハ別ニ滞ルルモノナク其レハ内ノ血氣循環ノ薄キナリ嫁セテ
居合司ハ肥滿ノ直リ去者タラシ若シ三四近モ許嫁ヲカケルト年
リ往ル故ニタトヒ産シテモ常トナリ肥滿ノ止ヌ者アリ又嫁シテ肥
トナリ瘦テ往内スルニハ茶カモ違スル者モ非ス勞瘵ノ孫ニ成リ
鬼録ニシク者ナリ処女ノ往水来ラヌ又寸候存スルナリ初ヨリ内意
ニテ頼ム人モナリ若カ只其マニセタラハ必実ヲ以テ苦クモ何モ
人ヲ横フ可カラス若シ分ラヌ様ニ捨置トスナリ其見ノ是ラヌリ
ソレシ者ナリ安ヲ以テ老んバハ当坐ハアレキ様ナリ后ハ及テ信
仰スル者ナリ往水順ニ由リ滞リナキハ秘養食ヲスルナリ不田リノ
人ハ子ヲ育スルナリ又其内ノ男子ニ無子モアル者ノ婦人ニハ精
ナキ者ナリ其力其代リ往水ヲ精ニ當テ可ナリ女子ノハ稀液ニ
テ往液ノ者ニホテ往水不田リノ処カウ服サト硬滿シテ肥滿ニ
スルナリ其ハ既出ノ生スルナリ鴈ニホテ九ノ妻ニテ吧氣ヲ
サバキ置カヨキトテモホテハ受セナリ往水不田カウマ既出ヲ生スル
ナリ此ハ主ニ子氏先見ヲサバカヨキ血滞リテ無阻モア
リ乳モ出ル位ニ成テモホテナリ又者ナリ服ニテ候ハ子ハ症ハ當ニ
ラフモノナリ氣ヲ付ベシ

血塊

塊アル者モ亦有孕近頃胎中固有血塊及子易ク塊又繋り腹大ニ
起塊ハトレテモ右ノ腹ニミツリ産后ハ又本如ク帰ル又二種子宮中
アルアリ是ハ多クハ妊セ又若孕ム者ハ其塊ハ去ル平生子宮内ノ塊
ト外ノ塊トヲ見ルニ子宮中ハ胎別ニ動ヌナリ動クトモサシク右ノ外
前後色トモ移リ動クナリ産后ハ四ツ有赤クモ去ル孕ム人アリ赤ク塊
カアリシニ妊中腹ニツミツモ痛ク子ト塊トツヒニ産後リ易ク産后目ヲ減シ
終ニ塊ハ失セシトハトテ胎別血下ラズ平生通リノ塊ト妊トハ見ヘ
難キ者但シ塊ハ何トナク里キ動キ難クナサハリカリキ子ハフウ
ワリトヤハカニサハリムクヤカノ月ヲ経テハ及テ知レ難キ此ハ足頭
ノ処トト氣ヲ付テ胎要ナリ惣ニ塊ハ胎中ノ腹脹カチ一知レ難キナリ
テモ出ルナリ故ニ胎ナシ胎中ノ腹脹カチ一知レ難キナリ
一面強ク腹脹スル故ナリ是モ子ノ頭ニ氣ヲ付ルカチナリ子ハ多ク
ハサキナリモ胎中難ク一婦人甲奈經水不下血塊ニ三枚アリ温水入テ
ナニ往水通シ産后娠ス年過テノ初産ナリハ果シテ難産ナリテ子ハ死リ
其片下リ物ノ平田ノ如クニナリ塊ハ次カニ減シテナリ平生トナレリ
誠ニシカシキ者其妊セシ時ハ決シテ一人ノ痛スル処ニ非ス
若ヨリ腹中塊アル者ハアツリナキ又若シ若シ孕ムスルハ父ス右腹ニミツリ産
ハ本ニ及リ産后ニテ出ヌハ子宮外ノ者ノ胎ハ任脈を通リテアル者ナレバカモ

アレハ多クハヨカラヌ又ニ塊トテモ大方中央ニアル者ニ血塊ニ下ルハ直ラ又必ス
陰ニ下ル子ハ直ラ又ニ塊ノ側ニ居クアウラ終身直ラ又者ニ抵多ク又
ミラ決シテ下ル者モ非ス下ルヘキ処サキニ但シ子宮中ノハ往々取ルヘキ
リ血塊ノ下ルハ稀ニ血塊中ニ血塊下ルハ大方皆傷寒ナリ血塊ノ自
下ルハアマリ無キ血ノ下リタラハ直ニメケヤラク紫黑色ノ様ナ物凡
者ハ胎カメケラナリ血ノミニ邪ス山産ナラハ其アトマナリ下ル物カ女レツ
ムルナリ血スハ直ニ止ヌ者ナリ長引者ニナキハ凡塊トナリ且胎腹ナリ
ルナリ徑閉者ハ必有者何レ徑閉又ハ胎カ内ニ多ク者故ニ張ナリ
者ニ塊トス様ニ里リ凝者ニ非ヌ何トナリ張ルニ徑水ノ惣体ニ滞ナリ
コ凡塊モ似ルヘキ凡塊トハ違ヒ何処ニモ里リヤキ者ニ妊娠ナリハ必スカ
クミラアルナリ又凡塊ノ内ニ妊娠スルモナリ其ハ氣ヲ付ミナト候ヒ難
ナリ便塊ナトハクルト一ナリナモナク所在モ異ナリナレ氏以テ
モ中央ニクミルヘキモアレハ必ス二ナリモ有モノミナ胎トハ異ナルニ
ハ積ルヘキイミナ政ハ胎腹ノ内ニ胎カ内ニ下ルハ塊ナリ但シ血塊カ
ヨクミナ別リ難キ者ナリ婦人ナト血塊アリ毒力徑行ナリナリ先大便秘
患ナリ数日塊忍ラヘカミナリケカラ石徑水カタルト大ニ血カ下ルナリ
子宮ニカ女レ胎ケラアン故ニ動ノ二ナリ者ナリ引カケラ出セシ
其塊ニミナヘイサラノ様ナ者ニ是ナリ切ハ枚ナ切ハ様ノ如クナリ

ナリ其カホシヨリ胎平生ノ如シ三年ノ間前ノ如ク大便閉シテカラ経水
下リ大ニ瘦テ経水止ト食モ進ミ手目ニナル毎月九ノ通リ子宮
内ニ塊アリテノ毎月経水ノ下ル者其レハ格別ニ塊ハ大ニテ又老ニ經
水カホヌト月一太ニナリ其ハ六ツク數カマニ其經水ノ下ル者不斗
塊スルツモ有テノ者ミナ塊モ出ル一カナリ子宮外ノ塊ハ赤テモト
シ又ナリ妊娠モスル者之妊スルト塊ハ左ノ方ニ出ル者ナリ産スルト本
又ナリ血塊ヤウ何ヤウ産ハ知レヌ故ニ直ラヌ子宮中ノ塊ハ左
ニ動クニアレトナリナキニ子宮外ノハ上ニ動揺ニ所在ヲ移ス者
其レハ内外ヲ見ルヘシ

經水

産后ハ一年ナモ経水カナキカ順ニ其レモ氣サヘ飲子ノ道ニ出ル様ニナル
大抵徑ノ早ク出ルハ悪キ方ノ順ノ通リカヨキ又氣ノ香内ニモサレウ通ス
ルツアル者アレハ其ハサレウナリ又甚キハ赤タニニ内ナラズシテ塊ス
ルモノアリ
妊中ニ經水下ルツマレモ不順故ニ非ズ然レモ何モ難産ナルト云フハ無キ事
ノモト義或ハ血多キ故ニ下ルハ盛胎ナト名モナリ又胎胎トモ云ヘリ花
極ノ者ハ不斗流産スル様ノツアル者大抵ハ害ナキ又妊中五六ノ時

分ニ血下ルイモアリ腹痛ナキハヨケレ腹痛者ハ小産ス又血ノカタマニモ
ノ下ル様ニナルト傷産スル者其レモ求ム面張ラアレハ可ナレト申セカタ
マル様ニ下ルハ定小産スルイモアル者ナリ膠艾區建ノ多クヤル可レ
トテモ慮スル者アラズ其様ノ者ハ又テ小産スルカ善キイアリ
其様ナキモ胎ヲナクノ瘀血モアリ其レハ下ルカヨキアリ気ヲ付見レ
ベシ血下テ胎ノ臍下ニウケ子ル様ニカタマル者ハ必小産スル下ラヌトモ
胎ノ臍下ニウケテカタマル者ハ矢張傷産スル血下リテモ胎ト
変テキ者ハ血モ止満胎スル者其子ヲ養フヘキ血カ下ル故ニ傷
レナリ人ノ癖ニヨツテニ孕ミテ有矢張三四月モ妊水西リ三四月ニ
止ム者アリ其レドモ其去胎ニ孕シタト思ハ月位ニ生レテアル
血様ニナルナリ向アル者ナリ胎ノ大小ニテ見定ム可シ又妊水ノ来
ル前ニ孕タルト又妊水ノ来時方アツテ后ニ孕ストハ一月モ先胎アル者
ナリ氣ヲ付ヘシ下リ物ノアル内ニ妊ミテ次方ニ小サクナルト大ニナル
トノニツアリ一通リ血ニ出ル者ナリ然レテ十月マテモ胎ヲモアルナリ大ニ拾
ノ下ル内ニ妊スルハ胎ハ次方ニ小サクナル方ノ者ナリ其塊アツテ下リ物ノ下
ル先ニ妊ナリ血塊アツテハ先ツ下リ物ハナキナリト知ルヘシ血下リテ塊
ナラ小サキ者ハ妊ナリ

小便因 附自利

婦人下利有
小產之後
痛者不發

五育尔便肉
或傷產有禍

小便閉ハ術ニテ通スルナリ其内自ラ便セト思ハ此術ニテ應テリ而小
便閉ト不利トハ異ナルヲサレツ通フモ小便セト思意ナキハ膀胱ニ
マラ又故ニ伴フハエカヌ中浮腫ト見ユ症ナリ小便不利バサレ通スル
及テ物身浮腫見ス小便閉ハサレ通セズ早ク術ヲ用テハ強
ク死スルナリ惣体妊中不利スハ申新スベカラスツク浮スル者モ急
ニ下胎スル者アリ其内腹痛ニテモアレハ搗女ヲアリ又小便閉ト小便
不利ノ腫氣ヲ通スルト列ニ棄スルナリ
小便閉ハ産前ニ無者ナリ大抵産后ニ其六内暖カウセ内煩マテ
アルモ有ル其ハ矢張術ニテ通ナリセ内煩アリ内ニテハ無キ
一ツ又臨月ニ至ラノ小便閉ハ定リイニチサへ出レハ自ラ通ルナリ何
モ術ニ及ヌナリ小便不通ニテ子ハ出ヌナリ産后ハ子宿収ラセテ
便道ヲ塞クフアルノ煩産ニテセテダ小便ノ通ル位ノ時分ニハ病人
ハサホドニ苦シコ又希々逆産坐産ノ後ヌナリ小便ノ通スル下ツテ
臨テモアルレ迄苦シモ甚シキナリソコヲ照シ合シ見ルニ之方順ハ
子宮下ツテ小便閉ニナルモアリ其レハ大方傷産スル兆ナリ毎ニイッ出ツ
ルレ云レ又故其力氣付レ云レ子脱下コトテハ傷産スルナリ又傷産
セズニ無事ニ生ルモアリ一藥ニハ云レヌナリ
血塊ニテ小便閉スルハ仰ノケミ以シメチウ倚シテ指シ下ニ押セル様婦

〇一處子
ナリ

産後小便

尤方ニ押シヤハ直ニ通スルナリ其血塊ハ外ニハ善キ又又ハナリナリ
又又至リ輕キ者ハナリ中ニ置キ傍ニ通スル重キ其上ニ置キ又又
后ヨリ指テ押シ上ト直ニ通スルナリ小産スル前ニ子宮下ツテ内ニモ
アリリレモ此術ヲ行フニシテ通スルナリヨリ無クニ安産スルモナリ
又又子小産スルモナリ妊婦中ニ小便内スルハ先胎力血塊ナリ外ニ
ハ無キ者ハ胎衣下ツテ内ニモアリリハ胎衣ナリ出ルハ忽チ通スル
出シテ通セズハ先小便ヲ通セズハ可キ又又子小産通セズハ胎
ヨリ術ヲ押スハ直ニ出ルナリ又又小便内スル位ニ胎衣ノ下ニハ出
コキ又又産後胎ヨリスル術ニテモ張リツツナリサレハ又又子小
小便ヲ押サハ子小陰門中ニ下リテ居物ヲ押サト
通スル者ハ子小陰門中ニ下リテ居物ヲ押サト
通スル者ハ子小陰門中ニ下リテ居物ヲ押サト
倒スルモ且々尿ナリ者ナリ后ヨリスルナリ抑カレテ
前ニ引コスル様ニメカニナルナリ通スルナリ妊中ニハ小便内スル様ニナル
ト大方小産スルナリ血塊ニテ小産内スルハ血塊ヲ力クニ押シタル様ニナル
ニハ自カウカク入ルナリ子宮中ニ塊ニテナリハ小便内ナリナリ子宮中
ハ小便内スルナリナリ其塊ハ茶ヲモトレ又茶ヲモテ逐ナトスルト其
ニテ小便内スルナリナリ其ハ妊婦ハセナリ若シ妊婦スルハ塊モ出テ

シモウナリ

小便通スルナリ逆産ナリ是ノフキヲアウテ通スナリハサシテ見テ六
知シテ氏具気付ノ様子カ病人ノ様ヲミテ量知ベキナリ其不相合ニ様子
悪キ寸ハ小便通シテモ気付ハ臨四二四モ小便閉スル者ナリ氣付ノア
ル者ナリハ腹ノ張ルハ即チ小便ノ多クニ子頭カ其様ニハルナリハナキハ
臨産ニテハ程子頭カカウチカ方ヘ行ナリ其ハ子サヘ生キテ居レハ
構カヌナリ轉胎ノモカタハ大指ヨリ小指ニテハ同ノ内カヲ入レ押ナリ
向ニ息セ其力ヲ強ク押ナリ吾レト衝ベスルナリ有者ナリ産地空
月時多クテハ小便閉スル者ナリ先産産ノ者ハ難産産在ハハ小便自利
ト不利トアリ何レモ八味丸ニテ宜シ難産産ヨリ経タレハ脱血ハセナ
リ故ニ直ニ脱衣ヲ出シテ可ナリ易ニ産ハ及テ脱ノ憂アリ
難産ハ清血ハナレ近ニ下スト腹カ成減スル故ニ暫クノ格置ナリ
自利スル者ハ六七十日モ或ハ半年モ終ルト終身道ラヌ者ナリノニナ
日斗リ後ハ隨分道ナリハ果九科ニテ可ナリハ陰ヨリ出リ者ナリ
小便セト思テハ及テ出スニ覺テ自利スル者ナリ子頭カホウ張ラハ内
其陰ハ傷メル故ニ自利成テ道ラヌニヤ産論ニ産不固ナリ云々云々
便自利ノ多ク云々不固ト云フハナキナリ

水腫

児を養ふ

妊中水腫養用ナシ食ヲ減スルカ方ナリ一度二猪口ニ杯位此布意ナド
大食ス可カラス其テ腫氣トレハ水ス只十日ノ内アミラ増ス様ニ
カ方ナリ如何シテ養用ナシトスハ其人体ヨクク内ノ子ノ為ニ害ナリ
養ニ足ラヌ故ナリ故ニ四重ナリ程水腫ハ増スナリ子生長ナシ養ヲ
減ナリ其減食ニテ次方ニヒタル度々食ヲ減ス様ナリ者ハ可ナリ
幾度ナリモ一杯ワケ共フヘト輕ハ腫モトレハ其腫強ニナリハ後
スル寸具生ル子無事ナリト追々愈ニ死胎ナレハ母モ死ス腫モ遂ニナリ
ルニ生ル子一日中モ生テ居リ死スルナリ其母亦ナリ長メ死ス三斗
リモ生テ居ルハ其母三斗ナリモ生テ居ル位ノナリ其腫ナリ、坊ニ
テ或又腫ニ終ニ愈カルナリナニ九ハ死スルト知ルヘシ若シナリ生
ル子ナリハ此ハタトニ健ニナリモ子カワタメ又希故ニソレハ其此ニナリ又
此ハ日々自氣ニ経験スル処ナリ
水腫脚氣ノ多量衝心症氣スル者ハ減食ニスト行ナリ麦テモ小豆テモ
赤針食ハナシ心スレモ及ヌナリ小食ニテ粥カコキナリ 塩モ慢ニ
禁スルハ及ヌナリ小食ニシテサハ通ハ自然ト赤針ハ食フ者モ非ス
又塩ノ多量ニナリ得スル故ニ知テ塩果シ断下云ハ可キナリナリ多量食シテ
滞ルトハ得スルナリ腹ヲクルト得ハ出ル者ナリ其果シ多量食スルト得ス
ルニ空腹ニナレハ得スル者モ非ス妊中得スルハ別ナリ此隨分食ヲ減

陰口腫張
可針

スルト五ツナリ水腫ノ病人ハ先期養生力有ナリ食ハカ論ノ一
短氣ノアル者ハ必サシムヘカラス若シ以スルトオホキモ曲ラズナリ生
ゼシムカ但シ坐ノ前ニ向様ニス可シ然ラサハ短氣直ラヌナリ腰帶ニ
シタルト宜シカラス帶ヲトルヘシ水ハ下行ク様ニスルカヨキナリ易ノ産
スル様ニナルト腫モトルヘシ腫カトル様ニナラヌト其様ニ陰口ヲ持テ延
キ腫カ止メトハ小産ヌナリ其ハ病カワノル故ナリ其分ニ陰マナ
腫ルイアリ八月後時ニアル者ナリハ動ノ固ニ無キ者ナリ又平人ニテモナ
シ畢ニ意子カ下ルニ因テ生レト欲スルナリ故ニ陰口腫ニ者ハ必サシ
又内ニ生ルナリ産后ニモナシ傷アレバ此ハ其前カヲ持テスナリ即チ子
ニハ決メ無キナリ其陰口大ニ腫ル色ハ赤モ宛ノ腫ク別ル様ニ
一候トス其時針ス可シ一抱モ腫ル者ナリ尤陰口ノ上ノキレトナ
限リトスヘシ其ヨリ上ニスルト痛チ覺ル者ナリ其切トナリ五六分モ下
ヨリ針スヘシサノ腫ハ針ハ及ハメ傷シ陰口カ腫レル様ニナルト僅ノ
間大腫ニナリナリ針ノ灸スルイ即効然シ全体ニ陰口ノ腫レルハ惡中
ノ毒ナリ如何トナシハ上ニ沖上スル氣カヤシト下ニ下ナリ上衝スル様ナリ
キハ傷シ初ヨリ陰口腫レル程ニ水ノタマルガ如キカナレバ其大腫ノ外ナリ
見レバ及テ去ナリ子ハ無事ノモマリ死胎モアリ不可一概陰口ノ
腫ル者ニハトル者ニ非ズ皆置ト店ハ敗爛メ傷レル者ナリ此術ナリ

行つてハ吐レテハ致シ難シ又輕ハワカワデサセルテ故ニ坐スルヲナリ
可シキ至テハサ子を腫レ出是ハ面ヘリトハ色サシ異ナリ然黒キ様ニナ
ツアリ此モ針スル能ハスルナリ脚ハヒロケテ一処ニスルヲナリ又ナ
リワレヲバハサセテハ中々コメヘラヌナリ陰門ノ腫レル位ノ
者ハハス腫アリ其レガ段々下ツテ来ル者ナリ陰門ノ腫レル全
体腫モ大ナリ九月位ヲモ催スト心得可シ方ナリ腫レル者ア
リ西方腫アリ又中ヨリ腫レル者ナリ子カ下ルニ因テ腫レル者ハ
ナレハサレテ構ハナキニ三ノ内ニモ催ト云道ニ色血ウヒカクモ
穴ノ引コム位ニナリ針スル早クスルト痛々血ヲ出シタルアリ何レ
カハ痛キ者ナリ針スル水出ルハムツキテ我テ見ル露ヲ探スル
針ノタラヌ処カヨリ短シ者ナリ其レ又針ス可シ指頭サキニ針ス
又探シテ斜針スルカ催キナリエハキレナリ下ニ針ス可シ下陰
中ヨリ木會陰ノ也刺スト痛キ者ナリ幾度ニナリ多ク針スル
リレカウ損ニ反サシ足向ニ商周ニ折テ入レ置テ其カウ痛ヨ
リ針スル段々ニナリタハミサクシテ左ハ足ト是ナリ振テナリ
糸程腫減ニナリ指テ探シ痛テ針スヘキナリ大抵産后ハナキ者
併シ産前カラアウテ直ラヌ者アリ又一度テハ多ク出ヌ者アリ大抵
二度ニナリ出ルナレト出ヌハ幾度モ針スヘシ産后陰門ノ腫レルヲモ

リ其レハ膏内系ニテニナリ水気ヲ又ナリ陰門腫者血ヲサレツ下
者モナリ大方小産スル其子カ死スル位ニ母モ多ク死スル者陰門腫
ルト其痛モ苦ム外カ卒ニウケクト又多ク食スル者堅ク禁ル
多ク食サスベカフス脚サトル腫ニ針シテ水ヲ取ル者ナリ其患
ナリ取之ナリ且水出テモ又アトナリ水ヲ生シ針ツナリ又針ナ
フ如ク始終水気カ足ニシヨツテ来テ死スル者目ナリ見ル
ナリ陰門斗リハ早速針セヌトアシ中モ陰門腫ル如何程利水
ノ劑ヲ用イタトモ速ク又布ナリ其腹外水気ハ上レモ陰門斗リ
ハ残ナリ若シ瘡置テハモモ抜ケ陰門形ナリナリ膏内系ナト
ナリ追々治スルモアレバ大抵ハ道又者一又其通ナリナリ者ア
リ后ニ反ナリ美シクナリ又陰門腫出ハ別種故ニ針シテモ痛ナ
リ惣身惣体ノナリ故ニ針スル追々通張スル水カ出テ終ニ死
ルナリ又陰門斗リハ年生腫レ又知ナリ故ニ能ク之ヲ男子陰囊ニ針
スルニ満クニシ産后ニ上ニ部大腫スルナリナリ面下部ニ三
尺モ張出ル様ニナリ急ニ下ガ善キナリ下リサスル自ラ直ナリ劇
シク咽ニテ塞ク様ニ至ルト死スルナリ産婦腫レテ衝心ニ位ケハ多ク
直ナリ只サシタレモナリ大ニ腫レサシテ難ク見ル其力及テ
直ラヌ者ナリ后ニハ不食ニナリテク者ナリ劇ク上冲シカケ瘧気又

ル母ハ下割リサシカケルカヨキ人多ハカケラヌ者之程此丹世秘
ノ多クモ一度サト下サヘスレハ善シ逆水ハフ極ニ水気上ニ冲
ハ臨月ヲモ生レノ者ナリ子サヘ生ルト母モタスカル者ナリ大抵死スレ
者之食サヘ減スレハ血レノ輕テモ食サヘ減スルカヨキナリ水腫ノ人ニ
腫カ律々増アリ又卒然ト増アリ其サト必定産スナリ又其小便
モ卒ニコク通ニ腫ヲ減スルト云モノモ生レ様ノアルモノナリ
ハ若候ニシハ産后ニナキナリ免角卒ニ小便モ不消ニ腫モ益ナ
ド云ハ油断スヘカウス凡ノ病固テ産スルハ其通リナリ凡病ニツ
テ小産スルハ其病ノ極ニ至ラ子ハ出ヌナリ大方母トモ死スル様ニナル者
ニ母ノ病ハナラヌ内ニ出シサヘスレハ母父スカルヲモアルヘキナリ
ナラヌ食ノサシテモ有内ハ出ヌ者ナリ其養イテ成位ニ成ラ出ル
故ニ母モ死スルナリ産前ノ水腫アルト後マテモ持ニセ居ル者
アリ水腫ニ段々ト腫カ下ニイテ短氣スル様ナリモヤ小便困スル
様ニナルト小産スルヲアリ其ハ産后ニ小便通ニテ腫レサレナリ
若シ腫カ段々上ニコト増シ小便スルト云キニ惣ニ病下ニコト方ハ
ニ六セカケ小産スルハ胎カウク子タ極ニカタマル者ナリ臨月ニ至ラ子ハ
心下ニヤリヌキ者ナリ若シ内位ニ処テハ心下ニコト沖ツキハセ又ナリ
陰門ノ腫レル位ニ至ルハ八九日時分ナリセ内位ニテモ未タ早キナリ

水腫ノ人延気衝ハスル振ノ人モ坐セシメ而チミテ脊向ケ肩ヨリ
撫シモスト忽チ息タツシキヲモ直ニナリ水腫ハ坐セシメタルカヤ
足ハ前ニ投ケ出エラウ構ハ又者ナリ免角指シウカハス振ニ接ストハ
其坐セシムル免角前ニスル者ナリ故ニ下布ノ膚團ヲス
ラ一尺不足折ワケリニ臍ノ処ヲヤル振ニメタレ坐セシムルハス
ベラヌナリノ以ストモ其通リニ置ト似シ振ノヨキ者ナリ妊娠
水腫ハ血ハウスク枯レル方故ハ臍血ナキモ之腫ヲヨキ程ハナリ又
者ナリ故ニ血暈ナシト云フハ是ナリ臍血ハタテ健ナ人ニアルモ水
腫テナクトモ子カ水腫ニ生ルハ一モアリ又母ノ食不足子ハ帶下ノヨ
テウク酒ノカスノ振ニキテナリアリ妊中ノ帶下ハサシテ構ワヌ者
妊中ニ熱シ持故ニソレテ帶下出スル振ノ一モアル者ナリ

鼓脹

鼓脹ノ妊娠ハ希ナ者ナリ折々アル者ナリ脹滿ノ中ニ押セ尼院者ナ
故ニ候ニ難キナリソレハ九月ニモナク又知レトモアル先服ヲ接スニ
胎服ヲ押サセ右ノ手ニミテ由ノ腹脹ヨリハビク其水動推シテ
サクホスナリト云ヘルト内ニナリ逐ヒハシケト身其スル内ニ子ノアル
支ラヒカヌニナリ段々ト下ミテ試ル中雪ロミテ急セ又ハ是胎ノナリ

其他皆ヒ、クナリ全体ニ鼓脹ノ至リ其ヒミキハ通症ニテ死スル者ナリ
其内妊中ノハ産スト愈ヘンフアヒ妊中テナクテ死スルハ通症ナリ此ヲハジ
キテモ志セヌハヨキ方ナリ其時ハ妊モ子ニ志スナリ知レバ位ノナリ鼓
脹モ面振アリ水腫鼓脹トテ初メハ水腫ミテ后ニ腹ナリニタマルナリ
其レハ治養ニフチ足ナト瘦テ腹ノモ大満ナルハ通症ニシテ直リ
難キ者ナリ鼓脹中ニ出產シテモ死スル者ナリ又助カントモアルモ
コレヲ候フニ右ナリナリ通シテノ横ガノ上ナリ指ミ格振ルト子頭
ノ動クモノナリ中々通ノフテハ知レヌ者ナリ又鼓脹中ニ妊ト重ニ安
ハ妊中ノ鼓脹ナリ其孕ハ時々ハ平生ノ如カ四五月時々カヲ病ノ出来テ
腹ノルナリ知レバ鼓脹ノ者孕ムナリナリ彼所謂水腫鼓脹ハ水気
ノ引カヌニ衝ベシ氣ナキ者ハ必ズ鼓脹ノクハ之衝ベスル直ニ心ニ沖リ死ス
ルナリ水腫ハ不四リノ腫ミヲ推判ノフハナキナリレハ通症ナリ何レ鼓
脹ニ改テ希徑内スナリ又鼓脹ニ弱ノ自然ニハレ切レ水腫湧出スルナ
リニホト始終出テリレカヲ常腹ナリ暖モ短氣モ直ナリ其左
直ニ死スルナリ其改テ針シテモ必ズ治スルナリ無キ、鼓脹水腫
ニ水カ血ニ化セヌナリ鼓脹塊アルハ又ナリ塊ノ外タケハ張ニ塊ナリ
ハナキ、皮ニシテモアルモナリ所謂鼓脹ハ塊モナク張ニ者ナリ産
勞テ咳ナト止メレカヲ腹ニタナリ鼓脹ノ極ニ腹ハルモノナリ咳強フ

疼ノ出ルハ下利ナリ疼ノ去ハ下利ナリ下利モ疼モ止ムトシカラ膜
満スル有ニルナリアルモノナリ何レ死セ子ハナラヌトモ止疼マスト止メ茶
ヤルヒ其ハ益ナリナリ

破水

懐妊六破水ナリセ子ハ何ヨリモ腹ニ有テモ痛ナリ破水スルト子カ弱成
テサレクモ内ニ有ルタケ弱ナリ其破水シタカセヌカハ其当知難キ者
ナリ子頭ノ髪カ子ナリ有テ膜ト白様ニミナリ能實シタカ付ルト
知レナリ又ヨリ経ルト自ラウタシテ能知レルナリ又オタ出ヌ内ニ膜
ヲ破ルナリ悪キ之彼ニ破レタル出ルモ胎カミナラハ出ヌナリタスハヌテ強
産ナルトアリ水出ルト子弱ル故ナリ又易キハ其膜ノ外ニ出ルナリ
ヨリハ傷ナリ若シカラス破水ノ出ルハ膜外ノ水ニ指リ又其膜中ノ水ハ
清水ニシテ清ナリ者ナリ不然ハ胎ヲ染ムナリ又其膜中ノ水出ルト子
死スルナリ膜外ノ水ハ満ハヌナリ候フテ居ルニ指ノミナリ内ニ破水ナリ
キナリ指ノカハム位ニ成テハ頃ニ膜外ノ水ヲホシテ痛キ者アリナリ余モ痛
ムナリ破水ナレセ子ハ痛ハナリヨリ經ヲ委難ナリナリ破水シテ三四ハ持ヌ
ナリ其膜外ノ水ヲボシタハ痛テ小便モ通スナリヨリハ未タ子ナラ
ヌナリ小水ノ通シル内ニ破水ハセヌナリ但逆産ハ幅産テモ小便通

破水者病

スルイモアリ又小便ノ出ル間モ破水ナケレバ若シアル代是非下カルナリ
子宮ノ周キニクモ著ニハアルコモアレハ先ナキ之小便モ通セ又位ニナツテ
モ小口ヲ来ヌニ破水スルモアリ直ニ下リハスレバ其下ル間ニ子ノ死スルコ
アルモノナリ先大抵カ小便ノ通セ又位ニナルト下テカラ破水スル者ナリ
リ膜ヲ肩ヲ指サレル位ニ下ルハ皆母ノ胎ナリ強ニ産ハコウケテ指イテウ
位ノ処ニテ破水スルコモ又指ニテ窺フニ破水セヌハ膜改メニ重ニサレル様
ノモノ之類ノ又ウケハ知位ニサレル様ニ思ワレナリ得モ其様ニナリ強
キニ産座ケモ小便ノ通スルト通セヌトナリ
子ノサハラ又位ノ希ニ母ノ死スルコモハ絶ニ無キ破水産後水ナク
子未タ下ラヌ又位ニ安スル故其ハ其ハ膜外ノ水ナリコリタル下ル又強
ニ産座ト腹水デナリ只腐汁ノ下ル者アリ要破水スルハ二度急ニ産後外ハ
後々ニ下ルニナレバ又人ヨリ膜内ノモ後々ニ下ルコモナリ其レ故ニ免角
如ハアテセズ自ラ指シ候ハ誤ニ又ナリ腹水ハ三ニ位アル者ナリ
多クハ二升モ或三升モ出ルアリ破水ノ多キハ頭ノ不足スル者モアリ未タ
破レサル寸ニ子頭ヲ候ヒテ水ノ多クハ知レルナリ子頭ノ水カ一時ニ出テ
子カ生レハ既ヨリ臍ノ水ハ出ナリ子カ出テモ臍ノ水ハ急ニ出ヌ又ハ生胎
ニテ母ノ方モニマリアル故ニ破水ナキ者ナリ強キナリ子ノ方養ニ取レ
故ニ水ナキナリ故ニ二升モ三升モ出ル者ハ必ス死スル事上タケ無キ血カタ

マリガクシヤクモ居ル者之色モ代リ目ナドモ赤ク突出モノアリ産
 前直腹ノ大シ水滯リ多キ人ニ有者之破水モ滿月ナワテハ精又
 ナレ氏月ノ足ラ又内ニ出ルト必小産ナリ膜ハ水ヲ包ムル爲メタモ
 具水ニテ子ヲ養フ之類卵ノ内ニアル曰ク我ニ又ク又温ナリハ頭
 ノ方ニキリテ無ナワテハ子ヲ養フ之類卵ノ内ニアル曰ク我ニ又ク又温ナリハ頭
 肉アル故ニ核モ保ナリ本ヨリ帶カラ養ハナセ氏肉ナクテハツタヌナリ
 フ徑テ其力破レルト核ハ自ラ出テモウチハ即破水ニ子ノ生レモ曰
 至義ナリ本ノ方ニキリテ無ナワテハ子ヲ養フ之類卵ノ内ニアル曰ク我ニ又ク又温ナリハ頭
 ラ養ハナセ氏肉アル故ニ核モ保ナリ本ヨリ帶カラ養ハナセ氏肉ナクテハツタヌナリ
 子ノ死スルナリ不可誣膜外ノ水モ待々下ラス大ニ出ルナリモアリ小便ニ
 テ通スルナリ破水セヌモナリ故小便ノ出ル内指候フナリハ其力甚
 ナリ産小便通テモ油断ハナラズ其ハ自ラ容体ガ異ナル之

胞衣

胞トカリ云ハ膀胱ナドヲサシテ云フモアルニヤ胞衣ト云ハエサニ産レ胞衣
 出ルモ子宮外ニ出ルナリトニツアリ外ハコレニ候帝直ニ在者之
 後をハ推置テカ六ツリハ自ラ出ル者之内ニアルハ其數中ニ出ル者ナラズ
 ニラ探ミテ宮下ニ出ルナリ子宮外何ナラハ唇ニテタレ極ニ腹ハタカトメ探ハ

ツチリトツブレル様ニチサワル者ナリ子宮ヲ引テモ痛ミ又故ニ大方胞ト
思テ子宮ヲ引テアル者ナリ不可誤

陰口入寸ニ陰門ニヌメリヲ取り能陰ヲ又ハチニ又リテ其ヨリ様ニ推入
ナリ心下ニカチミヲ能按ヘタルヘシ不然ニ氣ハ上ニ沖アケ其甚シテ大謬誤ス
ルナリ如クモアル者ナリ子陰中ニ入テカラハ九程ニナク胞衣ヲ取テ下ニナク
ヲ動セハ上ニツク氣味アルナリ其レ故ニ下ニハ能按ヘテ若ルカ自ナリ
胞衣ノ細アル寸ハカチミテ其レモ取リ人ヲシテ下ニナクサスベ
シ細ナキ寸ハ格別ニ下ニナク按スナリ得カクハ分婉スルナリ或ニ候ニ見
ル可シ胞衣ヲ残シテ出ルナリアル者ニ或ニ出セハ子宮宮シテ又故ニ出ス
ナリ且出タモノカ又上テ入ルト云フハ無キ者ノ膈帶アレハ其レテ隨テ右
手ノ食中指ニナリ入レ候フニ外ニアレハ或チナリナリ中ニシカリト取
テ子ハ出ル者ニ非ス時ヲ見テ早ク太指ヲ急カケテ引テ其内膈ヲ
膜ナドハ取トモカチミテ又者ニ中央ノ厚ク里ヲ取ルニ内ニアル者
ハヒモミワビテモ遠中カラ無ナリテ見ヘ又極ナル者ニ或チヒモヒモ事
ニモナラヌ故ニ有モ無モ曰フナリ強ク引テ或ニ帯根ヲ処ヨリ切レハナリ
其努力カニツテ引カルハ位ナレハ産後ヲテモ出スナリ年々産後ニ寸ニ細
ヲ引ト直ニ出ル者ナレハ先口ニテ引出シ置キ急ニ出スベカラヌ人ニ固リ
ツルハヤノクル極ノ者ニ或ニ出スト云フ人ノ思フ故ニオサナルニテ待ベキナリ

若出シタ故ニ死タ極ニカ思ヒ惡キナリ心得カクヘシ又甚キニ至ラ
ハロシモ出サヌアリ時嘔テ見合ヌヘシ胞衣子宮内ニ在テ出ヌ者ハ
六回頃ヨリ振寒シテ其カラ熱強クナリテ十四頃ニテ死スルナリ其時
ニ至リテ術ミテ下シ又ヌキヤルカラハ小柴胡加枳芍薬ニテ熱ヲサマシテ置
カヌキニ全体胞衣ハ四回メ位ニモナルト子宮宮シテリ胞衣ハ硬クナル者ヲ
術モ施シヨウモナキニ指ヲ入レテモ指ツカヒ難キニ是ハ入ルレハ入レト死
母カラマラヌ故ニトテモ仕方ナキニ而シテ後テナラハ右ノ如ク体ヲ保ツテ胞衣
ヲ出ヌカチ殺サリ全体ニ不出ハ死スル者ナレバ若シ陰ヲ施セハ下ヌヨリハ母ノ
体ヲ持様ニスルニ至スルカナハ九増ニシテ体ヲ保ツテ胞衣ヲ腐ス極ニスルト
不図ナルイモアルヘキカナレバ其腐ルニ至ラ母ガ持ツメヌ者之腹ミテ候ワ
ニ餘程上ニアルハ此ノ子宮中ニアルモアルニ又至程下ノ方ニアルバ出ヨキ故
ニ先術ミカヲ又内ソツト病入家内ニモ其症ニ從テ六ヶ敷云カクベシ吾ハ
子宮中ニ在ルナレバ病入カマシクモセルアル者ナリ心得置ヘシ指シ
テ見ルニ膈帯ガ指ニサワルフアルハ外ナリ一寸大指ヲイレテ胞衣ヘリ
コ撮ミテ急ニ引出セハ出テ至ラテ早クヌベキナリ彼是マカシク云内変
ナリ内ニ在ル者モ其通りナリ若ヘリカトモ難ク大指ノ入レ難キハ分ニ三指ニ
テ胞衣ヲ帯旅ノアタリシ瓜ミテ傷ルト云テウク者ナリコレニ指ヲ沖込ミ引
カテ出ヌカ善キニ上皮ノスヘリテ指ミヌル者之心得ベシトテモ大指ヲ

ヘレト撮コレ者並入初知ヨリ後行ニ途中ヨリ知カ上ノ方ハツト
無クナル様ニ骨元ハ子宮内ニアルナリ子宮トニ持カサワルト胞衣モ又
タルナリ連モ知ハ取レヌ者故ニ彼是ト病人ノ内ニ急ニ撮ミテ引出ス
何レ病人ノ短氣スル様ニドクト上衝スル故ニヤカシクニ者故ニ早ク
寸ツムカ術ナリ誤テ子宮ヲ撮ムベカラス若シ撮ム何モ損無キ
子宮外ハ子宮ノラサニ旋テ自ラ出ルヲアル者ハ子宮内ノハ決シテ
出ルハ無キ其チ入ルニ陰口ニセバウレテ至テ痛クノクニ者ナリ
チニカサ入レル故ニ疾ニツイタクニナリ随テチニカサ入レヌ様ス可シ陰
口ノ下ツク方ヘチ引下ケテ入ルカ善キ上ツハ横骨ニテ入テ引出難キ
至テハ長ク敷油切スベカラス何テモ余程コタヘヌト中々転ク出ル者
ニ非ス其帯ノ如ハ妙脚ノ様ニツケ三四カニウク様ニ引テ有者ナリト
ニアルハ紐ヲ引テ直ニ出ル者ハ指シ候ニ指ニサワルハ已ニ半クハ子宮
出ルナリ全ク子宮ヲ出ハ陰門ノ口臨ナリ子宮中ニアルハ中々出ナリ且
口ニテ出シ難キ者ナリコレ民六七時分ニ至ルト子宮痛トスル中々物アル
故ニチニ又ニ段々ニ胞衣ヲシメテ緩リ水無ク乾物ニナル然ルト心々登降スル
様ニツケモ早ク出ヌ様ニナルト十四時分ニ死スルニ出サスハ無慮ナリ段々
出ヌ者ナリト十四時分ニテモ持マタヘテ胞衣ノ腐ルニ生テ居ルト死
ルヲモアレ其ハ希ナリ子宮中ニアルハ八九分ニモナルト大抵寸四分

位ニテモカ内ニ抑アル故ニ収ラレ又故ニ六七位カラ必熱ヲ發スルニサナ
 ルト子宮内ニシテ決メ出ルモノニ非ス死ヲ待ヨリ外ハナキ者ニ六七位ハサ
 ラシキニ三回スルト減多ニ出ル者ニアラス死ルヘキ一ニマニ子宮外ニギ分
 テモ四五回モ出ヌ一モアルハ能ク指テ其所左ニ見ルベシ何レ大抵子
 宮外ニ落ムト自然ニモ出ル者ナリ腹ニテ候フニミアルト下ニアルトコ
 ニ其子宮内外ハ知レルナリ指ヲ見ル寸ハ稀ク之胞衣ハ帯知ヨリ一寸
 亦下ハ里ク厚キモノナリ子宮ヨリギ分出カハルトニ其力スナク厚キ
 処タテ出テシル者ニ其処ニ指ヲカケヌト出ヌナリ此ニハ瓜ニテモ者ニ
 非ス其薄キ処ニハ瓜ヲカケテ引出セ大指ニ指トミテ指分ニテモ

胞衣厚ト薄ト同如ク



月ノ多ク又六月ミテノ胞衣ハ捨置テモ構ワヌナリ随胎后ハ腹滿ルナレバ
 シハ胞衣ヲナシテ六月以後ハ從ニ胞衣カ熟スル故ニ出ヌトモナリ六
 月ミテハ未タ熟スナク又故ニ早ク腐ル故ニ何モモ出ヌハ及又之
 子宮内ノ胞衣ニ胃追ハ出レドワリ過ルト六ヶ敷ナリ又ハ順産死胎ハ
 六ヶ敷ナリ死胎ハ時ヲ経カ胎ヲソゴウカスルハ是非出レド胞衣

一、**寸進**（テハ五歩退ク）**極ノモリナリ**（ワレヨリ陰門ノ底シクルト指ヲ
 テサル者ナリ誤リ子宮ノ縁ニ撮ムヘカラス縱令指ニサリニ取ラヘラ
 スヘシ無理ニ引内ハ薄キハチキル故ニ引ベカラズ其カウセテ
 引タル帯ノ知ナシハ本ヨリ何処デモ其本タル処ニ集テ撮可キ具
 ラ引寸ハ次カニ出ルナリソレデモ急ニハ引ヌ者之ニ出ル寸ハ手ハ
 自由ニ出ルニ廻ハ横骨ノ上ニアル者ナリたスレハ廻ハ途中ミ見
 ヘ又極ニナルト孟ニ子宮ノ口エ入レテ見ルニ胞衣ノ障ルモアリサウモア
 尺其処テ指入レテ掻破ルヘシ時ヨツテ子宮ノ上カラ指ヲ移ルナリ
 下面カラヤルヲモアルナリ短カアルト胞衣ヲ取りトキニ去子氏短キト
 指ヲ押スト奥ニ入ルナリ其時ハ尺ノチニテ腹カラ指へ入れ
 一寸見ルト中々手之入ル極ハ思フニ此氣ニ忍ビザル時ハ

入る者之血入胞衣中張大不能下者妄矣上子之勢因之胞衣破
二血之入胞衣中張大不能下者妄矣上子之勢因之胞衣破
出ルル血口アル故に始て血ハ出テ何モ出難キヲハ無キ者之ヲ是母杯
ハ未タ胞衣不下内ニ帯ナリテ腹中ニアルヲアルハ其故帯ナリテ
メルノ血不ナリ胞衣下リテ后薄膜取リテ膈帯ノ極ニカク出ル者アリ
早く出スル者ナリ極置ナリイテ或ハ膈カラクル杯ハヤウナリモ
アル者ナリ早く出ルサヘスハ良キ之陰門ノ内ヨリ別ニ出ル者ハ何モ
無キナリ尺子蓋ノコナリ若シ何ヲモ出タラハ早く引出スヘシ薄膜ノ
血ノ段々ニタマリタルカ胞衣之故に胞衣ノ短ノ方入ルト薄膜ノ
取レル者ナリ膈帯モ一尺足ラヌ程出テアル者之其位出ラアルハ先
信ト知ルヘシ何シ子宮内ニアルヲモ長ハモアリテ計リ出ラアルハ
光子宮内ト知ルヘシ其レモ又提婆ノ切リ振ト短ノ長短ニ一極ニ
ハ云レヌ若シ指ヲ取ラマレニ破レウナレハ幾度モ持直ヌ可シ破レト
出難キナリ内ニアル指ナリナカク出難キ者アリ又ニ破レテ可シ先
モアル者ナリ免角破レヌ様ニ付可シ胞衣ガ子ヨリ先ニ出ルハ無キ
者ナリ若シワサミテ引出ス或ハ出ルヲモアリ胞衣ノ先ニ出ルト云ハ
重ナラヌ先ニ出タラハ大方人ノワサト知ル可シ順産ヲモ短ハ出ル
アリ横産ノ類ハ本ヨリ短ハ先ニ出ルヲアリ順産ヲモサユカマヌ

ト出ヌナリ但横逆ノミヤリ胞衣ノセテ出カリ出ヌナリ者之リハ
直ニ引テハ出ヌ者九在上下ニハカ論ヨルナレ随分取ラヌ上方ヘ
引上ルガ良キニ在愈々解ルハ指ヲ下面ヨリ入レテ引テ亦セリ太
シテモ善キニ惣テ子モルハ及ハヌナリ一通リハ並ニ引ケハ出ル者
ナリサシ出解ルルハ上方ヘ引上ケテ引カ善キニ
胞衣ノ努カ顔ヲ卷トムニ其レテハ紐ノ先へ出ルカ但シ出ヌ是指ニ
候フ時ニ指ニサワルキナリ且頭ヲ擡テアルハ顔ヲ絡ヒ生レ者有
カレベキニ之無キハ紐ノ頭ヲ卷トミ之ヲ如何ニヤ且頭ヲ絡フ者アル
皆是ハ當時ニ出ルハ初カラ絡フモノナリ俄クニ解ヌ若胞衣ノ
紐先ニ出ルハ難産方死胎カ住居ヲ傷子タルカ
好胎ノ胞衣モ子宮中ニ残ル者アリ術曰シ其内大抵ハ紐後ミナリ
故ニ出易キニ一通リハアトヨリ出ル知先ニ引カキテ始テ引ヌハ
ニ引片ハ出ルナリ子宮外胞衣ハ何リ解テ高ルニテアツテモ何レモ無キ
リ出テ助カレ云者ハ皆外ノミナリ子宮内ニテ高ルニテ紐カワナクニ緩
メテ肉
リ出ルハレヨリ前ニ通リテ高ルニテ紐カワナクニ緩メテ肉
横ノ如ク引テ出スヘシ蓋ノ如クハ子宮外ニテハ振ル者モ非ス平ノ方
ツカミテ出スヘシ能ク切レ易キ者故ニ得テ引ヘシ蓋ノ如クハ強
モ子宮内ヨリ弱キナリ兎角其知ノ根ハカラ切レ者ナリレ故ニハ

ツテシクナルナリ故ヲ引テヘリタトシテ帝ヲヘクヤウノ心持スルハ切レニ
其時ニ引テハナラズ只タヨリトス
胞衣ヲ各カフルト血氏是ハ向違ニテ各カフル正法ニ非ス通リハ胞
衣ニシテ帝アル者ナリ其内双頭双逆ノ多ニ各胞衣ヲ被ルモノナリ
此ハ一胞衣別ニナキ其内双頭ニハ一胞衣ヲ帝ニシテ連中ヨリ吸シ
テ二筋ニナルモノナリ
胞衣血ノコヌモノニメチメクナリ即チ瘀血ノ多ナリ水腫ナリ面
リ悪キ者ハ有合ノ血ヲ吸トル故ニヤ出産ノ代ニ心ス瘀血ノ多キ者
ナリ

賀川蘭舟先生産科秘卷之二終

賀川蘭杏先生產科口授卷之三

難波恭子敬

筆記

惡阻

惡阻六十月時分ウ盛下又大抵六十月前ヨリ起テ後々劇クナリ六十月時分ウ暴
トシ其ヨリ処又段々輕クナルリ食モ少シクナル極ナリ六十月頃ニ直ル極ニ
ナルカ一通リヨリ六十月前迄ニ劇キハ構々ナリ若卒日過テモ矢張其
ク六十月過テモ直ラヌハ惡候又五六月頃迄ハ構々ナリ七八月頃迄直ラヌ
極ニテ四ツ必死ナリ系ハ六スル者トナリ本ト胎カ出来ルナリハ隨胎スレハ
善キ外ノモノナレハ全体平常ノ隨胎テモ時ニ因テ死スルナリ其ユヘハ胎
ヲサスト其氣ニ順環シテアリレ血カ行ヌ極ニ成テ上ニ滞リ息モ止ムハ
カケルナリ左極ニナル極ノモノ故ニ決シテ隨胎シテ直ルハ極ニナリ箇極
ニ上逆スルト死リ待斗リ之桃仁承氣一ナトヤツテモ減多々心セヌナリ
惡阻ノ呃氣直止テ九月ニ至テ又臭腸ノ極ナリ者ハ呃止スルモノアリ危キ
症ナリ產座天方呃氣ノ止ヌ者ハ產座ニ呃氣カ止ヌト死スルナリ下
利テモ呃氣ヲモ產座前カラ持コヌト直ラヌ者ハ產婦下利ハ光ト三
日ノ必死ナリ產座ハ血虛ノ下利スルナリ又婦人三四日惡阻止テ

惡阻血有赤
 勞瘵血是
 三屬又

后臨月復發シ腰又不仁産症也吐止ミ臍逆スルト小便シテ目カ膜
 等者ハ危キ症ナリ劇シクナルト赤腹スル様ニルモナリ
 惡阻ハ胎食ヲ食ヌ故ニ瘦強ケレ正氣斗リハハス張テ大クナル者ニ是惡阻
 微ナリ其上面ハ瘦又モノ若面ヲ脱スル様見ルハ惡候ナリト知ル
 シ目外肉ハアマリ脱セヌモナリ其レカ脱ル様ニナルト惡キナリ
 惡阻ハ不都合ニ劇症ヲ発スルナリ
 惡阻テハ母死シテモ子生ムコト無キナリ其レモ四五月ヲテ惡阻有テ
 カラ一旦止テ八九月ノ如クニ惡阻ハ狀ヲ発シテ死スル生ムコトモアリ又生
 テ死セヌコトモアリナリ生テ居ルコトモアルハ九月ニ生ルハ血減シ
 テ養分不足又カラテ故ニ子モ多クハ死シテ及ビ生ルナリ惡阻ハ
 三四月ヨリ引起シ七月位カ最上ナリ是ハ血を蘇ル程養分アレハ
 子ノ方ヘモ血トシテ其奈リノ血カ上行メ食スルコトナラヌ故ニ不
 因本復ン肥ルヤウニナルコトモアリ
 妊中ノ勞瘵ハ惡阻ニ似レモ子カ母死スル前光ニ及ブ者ニ其ハ血有赤ト
 不足スルトノ別ナリ惡阻ハ早ク子サハ出シハ止モナリ血を養テ子カ
 トルコト又同ニナリ故ニ子カ大クナリテ血ヲトル様ニナルト止メ者ナシ
 セ月頃ニナルト子モ大クナルト最早止ムヘキニ又トルコトカ足ラヌカラ血カ
 工行メ胎食シテ死スルナリ全体ニ下ニ行ヘキコト力上ニ上ル故ニ胎食スル

様子ん者なり大凡他病ハ母死スルト子必ス下ルモノナリ 平中頼
死ノ後テモ必ス先子方下ルモノナリ其力要阻ニ張テ子カムモノナリ
ト心得ベシ近頃二婦人十九歳初妊シ六月雲田不正也此不食食其運
羸瘦尤甚シ死スル死セリ子果不食家人分産セシコリ欲スル由本
子弓割子ト来ト相伴ニコリ見ルコト死マ時コフルコト痛ニ馬中時死
騎腹仍微暖アリ而脚未甚硬此放テウアリ馬中解キナ陰門ニ反
シニ入レハ子食ニ僅ニ指ニ入ル計開キコリ候フニ雞卵ノ大サノ如ク
児頭右腹ニナリ指ニ耳モサハル右面創者ナリ小刀ヲ以テ子宮セ
ヲ切ラントスルニ傍人偽リ出タリトシ同ト下謝シ故ニ辞去テサシ子
ヲタツ寸ハ道ニ出ルモノナレ情ヲクハ急ニ寄ルコト陰月産産ニ死セ
ハニ出カハル故ニ母死セシナレ産産トナレ者ハ道ニ出ルモノナレ
月ノ足ヲ又ハ子宮ノ間カマ者故ニ中ニ出ル者ハ胎衣ヲ出ストハ大異
ナリ内ヨリ催サヌニ子宮ノ間ク者ハ胎衣又ハ胎衣トナレ上ノ様ニ大月時ク
ノ子生キテ暮ル内ハ系親大キニ腹ノ中央ニアリシニ死スルト直ニ小サクナリ
見ヘ又位ノ一ミナリ存股ノ所ツク子タル様ニ小サクナルモノナレ大人ヲモ死
スハ小サクナルモノナレ胎児モ同様ナリ
要阻ニ強強ハ上セテ死スルナリ而テ明ナリミルコトヲ解フモノナリ其
コ飲後ノモノハ捨置テモ直ルナリオナリ而テオナリヤルニ任サヌモノナリ其

血時分三向ト自ラ血ナリ其時ニ素ヲヤルト血ルニ心得テオホリ子
 フシ南匠先生ノ語ニモ熱有テ血塊ノ如クニ腹力盤子ノ如クニ成テ血
 過ルヲ直ラヌモノハ逆モ素ハ其カ又ニ蓋シ隨胎テ子ナヘテハ血
 ンヤカ事竟子ノ為故ニ何シホヌカ極ノハ試ミヌ故ニ如何ソヤト云リ
 蘭奇先生ノ語ニモ此ナリ前見ス惡但ニ死スルト實ニ症ノモノニテ
 血ノ多ク結フモノ故ニ子カ出ヌナリ他病ニ因テ死スルモノハ子カ出ヌハ
 可ヘナリ惡但直ニハ血塊瘦弱シク口乾燥シテ不陽使ハ杯ヲ吐クモノ
 可ヘナリ一婦姓張滿月脚氣ヲ患テ死ス其族死相リ出サシテオホリ
 諸ヒシカハ先生素ト同本生ト命シテ出サシム候フニ己ニ子宮ノ
 下口ニ望ムト虫氏順逆由生ト異ニシテ未タ子宮ノ脱セヌ釣テ子膏
 ヲカケ出シテ子宮ガ切ラ南モ固生ノ法ニ準シテモセリ即チ文化十一年七月
 ノナナリ京都府京市河原町
 一利婦二月十八日往水以期至三月八日卒然ト惡心嘔吐不食良三月
 果往水不食至四月八日死此由未止恭按先生往病之病不與
 此婦吻合此婦往水守己之前十日已及此症記以婦事考

死胎

九破水ニ至三日ヲ経テ者死胎ノ例ナリタトハ六月十日ニ及ニ未破

水セサルモノハ生胎ナリ

九臨出產テ崩血スルモノ死胎ノ例ナリ血下ルト血直息ヨク脈數元

モノ多ハ生胎ナリ

胎衣、勿子ヨリ先ニ出ルハ死胎ノ例ナリ血下知ト共ニ出ルハ分論死胎候

九カ息止テ胎ヲ好ミ脈沈遲タルハ死胎ノ例ナリ

産以前ヨリヨリ脱血スルハ死胎ノ多クハ母モ死スナリ

九妊娠中ニ大ニ腫滿シ臨月ニ滿ス或ハ月ニ或ハ月ニ氣急スルハ死胎ノ例

ナリ臨月ニテモ保ハ生胎ナリ然レモ又腫滿シテ氣急從血スルハナリ

死胎ト知ルモノ

破水セテ二三日経ルモ胎具破水ノ時カ知ルハ其レヨリクハ知死若

シ破水セシモ力知レ又成ハ何ヲ以テヤニ日トセシヤ彼此トカケ合ヒニ

知レ又ナリ先指ニテ見テ破水スルト又破水セヌト并知セヌモノナリ

吐山知レ云知リ子弱モ乾キサツタトシタリカ息ナトモ無クナリハ固ナリ

破水ノナリナリナレモ又何頃破水セシト云フハ知レ又之ヲ候フニ破水

スル時胎ハ氣ヲ倒シセシ如ク上大ニ下小ナリ一日程ミ上下下上ナリ

極ナリナリ二日程ミナリト下カ文ミナリハカマウ中ニ出ルモノナリ

中ニ出ルモノナリハナレモ又下カ張ル故之又其カサミ過ルト

中ノ段モナリナリテ一面ニ口ト云極ナリモ其レミ其破水セシ時ナリ

モカシ知ルヘシ又問ニ何頃カ息強カリヤト問ニ其カ息強カリシ
ハ時カ即破水シタルナリ知ルヘシ破水スル前ナリ子頭下ニ故ナリモ
ナルモノナリ破水スルト小便ハ通ジヌモノナリ此等ナリ者ナリ其破水
ノ時ヲ知ルハ出来ルナリ三ノ者ヲ然シ見テ其セヲ察スルハ
ルナリカ息ナリト死胎ト知ヘシナレバ又速ニ止ト云フナリ向ニ余
ミテカ息アリシト不斗相止静ニ相成ナト云フアリ之ハ又時ナレバ
者アリヌエラタト云産スルハモアリ此カ息ナリト死胎ト断
スヘカラス死胎ニカ息ナクナレハ漸々止ムモノニテ卒然ト止ムハ
胎ノアムモノナレバ死スルト其合セカ難類ニテ一段ツク位ニナル者
時ニ因テ其頭ノ動キ鳴聲ニ覺ヘラレハ死テアタクナレバ又病人ハ苦
者故ニ早ク死胎ニ成テカ息モナクナレバ腰ノカシ強ナドムラカカリ
生動スル様ニ思フナリナレバ病人ノ云フハ當テニナラヌ者之自ラ極テ
其子頭ニ指リ添ヒタク自若ク候ニ將ニ其内ニ腰カハルハ云フナレバ
其胎ノ其頭カサレテモ動カレハ死胎ナリ但モ腰カ張ルナリナレバ
極メ居ル内ニ動スルナレハ死胎ナリナレバ死胎ナリナレバ死胎ナリ
氣モ固ルハ之七位ナレモ死スルハ又三三ナレモ早死胎ニナレバ
母マ子ノ強弱モアル者之一概ニ断スヘカラス又上皆順産ノ候法ニ
尚興脱血ト云程ニナシサレ位下レトテモ減タヌ死スルト云々ナリノ前

產前
脫血變症

與サレカタリタルカ下ルモアリ又薄キ者下ルモアリ薄キ方分チ構ニ
テラヌニ全休胞衣ノ上ニツラ産座ニ出ヘキ血ヲ下ルノ故ニ胎血ヨロシカラヌ
カ息カ強ト前血カ息ヲ止テ之ハ何モ難産ニナレハチキナリ好胎
モ又未タ産サヌ其間ハ随分胎ルイモアハチキナリ此モ一様ニハズ又
ニ得居ヘシ胎ヲ好ハ向ハ入ルトハ非ナリ易産ニ無モノナリ此ハ何モ難産
ト云フハナレ其候ニ照スヌ為ニ參ルナリ
横産ニ素ヨリ必死ナリナレハ生胎ナリト云フ決メ無キナリナレハ
又大方皆死胎ニ所レ彼ノ横産ト整トノ別アリコニハ皆横産ト云フハ整
産ハ臨産ノ在ニ難ナリ此ハチキナリ又死セヌイモアリコレト
テモ多クハ死スル方ナリ横産ハ必死胎死ニ改メ横ニナリナリ生テ
レバ大張正胎休ニ居ルヘキカ死ノ勢ナキ改メ動ニ動ニ横ニナリナリ死胎
ニモ程ヨク横産内同チ頭ヲ入レテナレハ正産スルモナリ
逆産ナラハ死テ若クモ生テ産テモ早ク出スヘキナリ何レ死スルモナリナレ
出ヤウ逆テモ死スル方ナリ又逆産ニ易易ク自然ニ出ルモナレナリ
ナレハ出カケラ早ク休リ施スベシ自然ニ出ル位ノハ死スルハチキナリ
脱血方一大難症ナリセ内位ヨリ折々サシ血カ下ルイハチキナリ
ナレ者ノ約スル如カ九内頃ニ至テ大ニ脱ス病人元氣盛ニシテ身ヲ
旁下ルサドニ云ハレ内ニ出産スルト母子共ニ死スル者ナリ元氣盛ナル者故ニモ

道ニ思フテ氣ツカヒモセヌナリ初リ云聞セラクベシ或ハ産ヌ内ニ死スルモ
アリ其甚ニ至ルト子カ腹中ニ轉移シテ横ナリ頃ナリ頃ニ至リト云ナリト云ナリ
又ナリ又ニカタマリニナリ又ニカタマリニナリ又ニカタマリニナリ又ニカタマリニナリ
ト云ナリ候フニ子頭カ出ルト思ヘハ又ニカタマリニナリ又ニカタマリニナリ又ニカタマリニナリ
クナリ候フハ必然死シ待ベキ又ニカタマリニナリ又ニカタマリニナリ又ニカタマリニナリ
ハ無理ナリ故ニ大ニ難産ト云産后ハ脱血ナリ又ニカタマリニナリ又ニカタマリニナリ
腫滿ナリ出ハ病ニ同ナリ何モ子ノ自ラ出ニ決ス其病ニシテ出ハ病ニ同ナリ
之臨メテモ出ヌ死セヌト云ハ病ノ為ニ死セヌシテ持ツタヘテイルヤ云云胎
ナリ故ニ病ニ同ナリ臨メテ出ヌ又ニカタマリニナリ又ニカタマリニナリ又ニカタマリニナリ
モナリ病ノ為ニ死スルナリ水腫ニ限ラヌ何表ナリ此ナリ胎力下ル様ナ
ルト大方モ死スルナリナリナリナリナリナリナリナリナリナリナリナリナリナリナリナリ

右壬申冬ノ二月廿四日紀聞

順産ノ難産ハ指シテ水キレヌカ知ルヘシ大抵一日二日経ルト健マカん様ナリテ
モ死スル者モ水キレヌ内ハ幾ラ痛テモ極置カヨキ破水セリト云ハ横ナリ
三日モ始メ子ハ知レヌサシテ見ルニ破水シテマナ此ヲ尋ルモ水ハ始終下ル
ト云ハ知レルナリ難産ノ者ハ水ハサシテ下リテ一時ニ出ヌ故ニ同ナリモ知レ
ヌナリ其何頃切レヌ知ニトモ其氣付僅シナルハサシテ下リテ一時ニ出ヌ
故ニ同ナリ何モヤト他人モ同ヘシ其時カカフ痛モ強クナル者故ニ其頃

大腸死候

甚ク産スル位ニ痛ムハヤト向ヘシ其時ヲ破水トス又ニ度モ其候
ノ一アルモアリ其カヲ小便ハ何頃ニ通スルヤ何頃ヤト向ヘシ其小便
ノ不通ノ時ト候モトカケ合ヌ可シ其内小便ハ半時前ニ不通ニナル
一アリソコラニ度ノ如ハ小便ミ引合シ知レシ小便通シ又極モ少ク
右ニ破水スル者アリ小便通シ又極モ少ク産ミナルト一モ破水モ又
ミアリ大抵事ノ位ノ如カヲ破水スル者ニレ其候ニ時分ニ知レシ其
時ニ臨ム推シ知レキトナリ何カ息ノ強キ時分ニ知レシ者ナリ其
昨日盡時分切タト息ハ申候中モホキテ候ナリ子顔ノモモサ
ニスヘリ産婦氣力要モカレキ又メリモ有候中モ乾カス凡ハ不都合
ナリ食事ヤ湯ヲ内ヘシ死胎ニナルト必湯アル者ニ死セ又内湯ハ無
キナリ彼ノ腹ノ形ミモ候ニ見レ可シ死胎ニナルト息モ力次ガヌル
ナル之候モ遠止ミモアレバ其ト考見レ可シ息モ力次ガ減スルハ死胎
ニナルナリ腹モ張ラヌ其時ニ生スヘキ之脹ラスト云テモ指シテ見レト子
顔ノスツト動フアリ其レハ至テ生サレタリ又母ハ息ミテ子動ト云
ヘモ指シテ見レ向ニ母ハ力息ミテ子顔ノ動フ無キハ者ハ死胎ナリ
何モ母ノ息モ盛ナレ内ヲハ術ヲ用ユルモ母ノ息ミテ死胎タリ母ハ力息
アル内ニハ母ヲ使ナレ故ニ生カヌト云モ何モ指シテ死胎タリ母ハ力息
其母ノ力息ミテ自ラ出ルイモヤル布ニ大抵子ノ死スルハ内母モ弱タリ力

息モナクテ者ナリ出ラレ又ニ因テ死スルハ自ラ出ル
ニ子ヲ弱クテ死スルハ自ラ出ルヲモアルモ之出ラレ又カウ死スル物生ノ入ト
ハ異ナルナリ子ノ生テアル内ハ少シヨキ者之其生レタノヲ出ストハナラヌ子サヘ
生テ居レハ母モナクモ痛ナク又ニテ死テ一ヨハ横ハス者ニ日ヲ過テ子色カ
ル位ニナルト母モ弱ナリ其内息元ミテ見カレテカホスルハ死スルハ母ノ
勢ノ弱キ者ナリ可能察之死胎ニナラヌモ指シテ洗テモ安張其キ
者ナリ内シ臭気デモ死胎ノ臭ナリナリナリ具ハビデハ云レ又ニ平ヨ
デ王陰中ハ臭キナリ只魚テアヲ臭キテ死胎ト大ニ異ナレ死スルハ頭
ノ熱カクイテカウモアル者ナリ指シテ見ルハ血ニ分ル者ナリ生テ居ル間
ハ血ハナリ居ル者ナリ順産ノ候カカニ六々敷ナリ其レを母ノ強キアリ子
ノ弱キアリ母ノ弱キアリ子ノ強キアリ母ノ強キハナリ力息アル者改ニ知
レラヒナリナリ色ノ妻ノカル位テモ其力息デ生レテモ有者ト
サシワハ横ハ子色ナキ血スレハ其色ヲ向ヘシ赤血ニ異ナリ重テカルトハ
悪候ナリナリ其具ハナリ入ル極ノ一ハナキナリ自然ニ出ル者ナリ息ニ強キト
下リモノ、去者ナリ下リ物多ケレハ息モハゴ又者之併レ以テハ自然ニ出ル
者ニ強産ハ安在ナリシヨリノヨキ者ナリ之脱血スル候ハ子ノ息ニ強キハ
子ノ出ルモ易キ故ニ強産ハ此トナリ向ナリト自ラ出ル者ニ強産ハ
スレテアル者ニ五テ強産ノ力カマシ健ナレテ無ラハ強産ハ無キニ強中ニ固

肥衣紐先出
ル者必死

ナ者多ク殖産ナリ弱キ者ハ及テ無キノ自ハ様子ノ劇ヲ指シテ見エ子
ノ動ク者ハ生キテ出ル者ハ死スルヲアウテモ子ハ産者ニ出テアル者ハ又其全
体ニ息ミテ様子ニ因テ内極ニ息ミテアウテモ子ノ弱ク死スヨウノ様子ノ知
レルコトアル者ハ其レハ口ミテハ云ハレヌナリ左ニ出ル下リ物カ母ノシテ惡キ因テ
先ニ出ルナリ
肥衣ノ紐カ先ニ出ルハ死胎ニ限ナリ疑ヒ無キナリ血紐ナルハ云々及テ又分論ニ肥
衣カ子ヨリ先ニ出ルハ無キナリ
一休ニ同入ルハ又胎ニ指ナリ何モ死胎ニ限ルナリ無キナリ弱キ人ハ胎ニアル
者ナリ何モ善キヲ入サケレバ死胎ハ云々又死胎ニトス又胎ニアル者ハ又
之胎ニ死ハ死胎ニ指ナリ短ル者ナリトモニカ又ナリ又子カ死シテ母ヲ
死ニシテアル者胎スルハ必死ニシテ大抵胎リナル者モ死胎ニト限ルナリ
又之胎ニ向ハホクメ善キナリ
整横ト横産ト云々横産ハ分論ニテ横モ必死スルナリ傷シ頸トモロテトハ息
ミニ因テ出ルナリ又レハ横産ハ早ク術ヲ行フニ死ナリ又横ニナラヌ者ハ云々
ミテ死スルナリ無キナリ整横順産ハ回生ニトシ得テ可ナリ其内整横云々
ハ子ヨリ無キナリ子カ出レハ皆産横ナリ子先カアルヲ順産ナリ又ニ
横産ナレハ横産ナリタト何モ出ス死胎ニ見レハ胎ナリナリ即横産
ナリ子先ノ胎ナリト云々別ニ無キナリ凡ト云ハ生タモテ死タモテ二定ナ

逆産、早ク
出スヘシ

産前死

ラヌヲ云ナリ逆ハトナラデモ出メアラウ子ハナラヌナリ生胎ナラウ尚、早ク出ス
ヘシ病家ニ必死ノ様ニ云置カ蓋キナリ半回テモ生胎テモアリノ四ナヘモ有
ハ定ラヌナリ併し而モテハ一時テモ死スナリ能々強キハ半回モ生テ居ん
モアレ氏先無キ者ニ是出ラヌナリ也曰義之逆産ハ早ク死スル者故ナリ
分生キテアルノニテモケツタスルト死スル者ナリ術ヲ入ル位ノ逆ハ生キテアツ
テモ直ニ啼スル水ヲモ既テカラフ啼者ナリ直ニ啼ク様ナハ術ヲ入ルヌ
臨産ニ至ス氣ノ付ヌ内ニ脱血スルハ母子共ニ死スナリ大方易産ト云ハ血ト先
ナリ甚キ至テハ子ノ出ヌ内ニ母ノ死スルナリ又胎ノ子ニトク子スル様ニ子
カ候月ノ血ニアレハ母ノ生んフモアルナレ氏先死スルナリ又胎ノ子ニトク子スル様ニ子
直ニ死スルナリ目カ見ヘスナリ衰々方カヌテ古キナリ轉産ノ胎中ニテ
上下左右ナリ母ノ死スル者ニ術ヲ用テト術ニテ死スル様ニ思フ故大抵術
ヲ用ヌナリ本ナリ出シヨキ者ナリハ九ノ内頃ノ目大方出ヌ者トナリ出シヨ
キ者トハ九ノ内頃ノ目大方出ヌ者トハ九ノ内頃ニテ位ノ者砂ニ寒ニモ出ヌナリ
小キ者ト生シヌ内ニ母ノ死スルナリマニナリ以産前ノ胎中ノ集ナリ前
ヨリ血ヲリルト臨産ニ至テテ胎ノト別アルナリ又血カニテ胎血スルハ必
佛産スル者ニ何モ構ハヌ者トハ九ノ内頃ノ胎中ニテ胎血スルハ必死之其傷
産ハ血モサシワ下ニ胎血ハ胎中ニ下ナリ胎ノカカタナリテ横骨カニ胎
子彼此ト動揺スルト必死ス候ナリ

母水腫子死
者母亦死

聖術

水腫ハ限ラス臨月ニテ持テハ健ナリ其ヒカ速ニ出テハ病ニ因テ改ム死
本腫ルト云カ子ノ方ニ取ラレナリ其カワクホト子ハ健ナリ十月ニテモ病ニ因テ出ル
モアリ氣急促血スル極ニ下具ニモ病テ出ル改テ死胎ニ之モ難産ニ至ル
希ニ改テ腫ル極子ニテ見ルヘシ子カ達者テ出ル腫モ重ニ子ノ死タルハ必知
モ死生者之難治ニテ子ノ死生ミテ母ノ死生モ知レルニ子ノ死タルハ必母モ死ルニ
産前ガ腫テ子モ生テアルハ直ニ産子ノ死スルハ母モ死スナリ奈程輕見テ
モ死テ出ルト子モ母モ死スナリ又モ八月ノ内ニ臨タヌ内ニ出ルハ母モ病タヌモアリ
九月臨月ノ場ニテ出テ死胎ナルト母モ死スナリ子カニ生テアルハ其位ニ
モ遲ク死ス位ノイナリ可心得
田生ノ術ハ夜者ヲタヌミ其上ニ産間ヲ布キサシナリ産左動カサレ改テ産ル
前ノ用意ニ置ナリ其産間ヲ上ニ別ニ一枚布タヌ大穢レルナリ若愈々病ニ至ル
ハ其夜ニテ布ヘキナレ産カキ切テ後ヲ尺山ニ布クニ否ハ穢レルナリ其ヒカ
ラ若産間ニ一枚クルリト巻キシテ産カケルニ大穢レルナリ其ヒカ
惡キナリ不斗カヤルヲアルナリ其レヨリ此方ノ西脚ニ婦ノ面脚ノ中ヘ入レ
テヒラキ婦人ノ足ヲシテ腰カケテケテテ踏シテ付ミハ若キナリソレモ尋常ノ
ノ婦ハ穢レ足ヲ自由ニモ子ハ我死ノ者ハ足ヲ自由ニモ故ニ前ノ如クスヘキナリ
何モ長ク此方ニテイタテ故ニ其極ニナラヌ又足ヲ伸モ自由ニスヘキニ産間ヲ
一枚ツハ子ハ真氣ニテ入レヌ冬寒時ハ我カ后ニ口口モ右左ヨリノ肩

図一 一枚ツカケ合スヘシ其カハ前・鉤ハ紙ツミ・横裏襷中ニテ置テ腰
 ツカケシ時ニ寸帯ノ内ヨリ衣物ヲスリカケ衣物ヲハクリテ並ニ腰カケシタ
 スキヲカビルナリ其レヨリ寸帯ニ三枚ニ尾ノ下ニセカクナリヨリテ鉤ヲ出スニ後
 ノ上ニラトシテモ掛ナリ衣ノチヲ指シ候ト見ハ子頭アル有ニ至ラセニアレバ
 大指ニ本サシ大指ヲ順カメ無名小指モ具上ヘカメ其内ヨリ鉤ヲ入メ鉤先
 ノ方ニ向ル極ニスナリ否ニハ若シハレシ時陰口ニ引カケルヲアル者ナリ陰口
 裏ニ引カケルカ毒キナリ其カケ極先指頭ヲアルト歩計モ先ノ方ヘ出シ輕
 ク引カケ皮ヲ編メ又指ヲ押込又皮ヲ二兩度モ編メ其レカラ指ヲ裏ヘ入レ
 其指頭ヲリサナリオクニ入シツカリト引クヘシ肩カケヌトハレシ者ナリ指
 頭ヨリ格別ニ裏ナルト板ク時々危ヘ引カケルヲナリ其レ故ニ指頭ヲ去
 レ其裏ニアルトハエタヌ之左指其後又カスニ鉤ヲトラヘテ右ナチヲ係ニタシ
 若シ至テナチナリ寸六強クヒクハ要ク只上ヘシアクル方宜シ之會陰ノ内ニ指カ
 入レホタ裏ナルト故ニハ引ナリガ宜シ大抵ナリ引スニ右指外ヘ出
 タ時ニ右ナチニ會陰ヲ抱キ其單行ヲ行フヘシ然サニ寸破レナリ者ニ鉤
 ニ破リ中ヲ如キ方ノ出レナリ者ニ又引ニ心傷アリ只頭ニ皮ノヒルナリ者
 極ニ危ルナリアル者ニシツ出ルト思フハナチカイノ候ニ出レハ何トナク大キ物
 冲キ出ル極ニ危ルナリ其皮斗ノヒル者ナリ引ナリナリ者ナリ心傷ニシ
 又甚裏ナル者ナリ毒ニナリカケテ子ナリト頭カニナリテ向ニ出ヌ極ニ危ルナリ

若たスハ釣リ強ク如ニ引カセハケルトワス所ハ下向ク疎ニル者ニ其体自然
ノ方ミ術モ仕張アレハ人ノ口サミテカハ六ヶ敷ニ其母タノ奥ニテハゴ子ル
ナクエツリ引カケテ方ハ引出スリ其上面ニ鈎スルハ甚ムケルニ夫張
下面ヨリ傳テ上ニヤルナリ如ク負ミル者ヲ上ヘゴ子ルハ彼ノ顔ハエツカセ
難ツナル者ナリ其力ニアル内先ツセカ宜ク推置テ下ニ推置テモ出ル者ナラズ
婦人ナラハ推置テ捕子モ若子ナラハテモ先付ニテ死スルハ痛ノ為ニ死ス
氣付ク故ニ夫ノ孫ノ内ハ甚ム奥ニテテモ早く出サリナラズ又其時ハ彼ノ上面
ヨリ引カケ出スヘキナリ其出スハ又ノミテ頭ヲ包ミ持ヌトスルタムルモナリ
其力カウチナ出シ逐ニ易ク出スルハ出タラハ直ニ若ノキミナリ直ニ跡ツガナト
ツ下血出テアミキニ寸接ルハ格別ニ又モ其力カウ婦人ノ好ミ從テ左
臥サシムヘシ其内ニ尋テモナラハ其方ヘ向カ宜シ其横ニ臥シテ置其内ニツ
ギミナ子ヲ拭ヒ終ラ居リ胎衣ヲ出スナリ横ニ臥シテ正面積ミ出サシテ
子産後張ツミテ接ルカミミ其子頭ノ出ル時分ニ盡ク求メ置ツカウ取出シ
人ヲシテ子ヲ見セシメ其生ルト直ニ女禪位ノ者ニ包ミテラ其子頭ヲ母ノ
尻ノ方ヘ向テ足ノトツ見セシメ頭ノ傷モサナトハ髪サエ撫ツテハミ子産大ニ
傷ルト直ニ知レル故ニ彼ノ人ツモ見エヌ様カニシテナリツカウ胎衣ニ包ミ
盡中ニイレテ紙切リサシテナリ盡ノハタノ内ニカウ取カ前ナリト示スヘシ母ハ其
ミナ動クハハナラズニ随テ静シ服様スヘキ右ニ内ニテ記

子頭カウリ會陰ニ杯ニナル最卑厄ノチニリ鈎モ兼持テ右ノチニ會陰ニ
シヨモヤルナリ在ハ痛モノチリ出タハムニキテ右ノチニ直クハ頭ヲ引
直ニ出ルモノサシテモカハルハ子ヲ直スカキヲ出スカ其時從フヤナリ
エノ方ニカハルモノナリ腋カ出カハ其レ既持テ子ヲ直スナリ右ニ出シ右ニ陰
門ヲ按アルニ殖産ノヤトミ胎位ノモノミ胎位ニ者殖産ニ出シテモ宜
全体脱血ノ時節ハ過テアルモノナリ
田生ハ免用子頭ノユカミヲ見ルカ分ナリ寫ト見定ニ其申安ノ人ニ鈎ニヘキナリ
吾等サレハ出難ナリ氣ヲ付クヘキナリ
候ニ見ルニ子頭ノ跗趾ニ氣ヲ付ヘキナリ大抵其氣モ知ナリ息ミアル内ニ安
術ヲ施サレタリ腋ヲ候フニ下高堅ク腋上クホミテ又小腋小使帶リ形顯ノ如
ク子出ラ厄ハクホミ無クニツウハリト張クニテ堅固セス其子ヲ出サハ直ニ膈
帶ノ脉ヲ候クヘシ若シ動氣アラハホメタ生テアルナリ其指シ候フニ背而シテ
ナリ右面ナリ其故ニ鈎ヲカケルニ其心得シテ婦人ノ厄リ者右ノ方ヨリ
鈎ヲカケルナリ鈎ヲ入ル頭ノラウテイニカク其後引胸ハ出易キナリ其トウ中
ヨリヤルト及テ出難キナリ右右ノ方ヨリ引カケル心得シ置クヘシ男女同
右面ナリ其場ヲ二轉スルニ背而シテ出ルナリ其背而ニナルマテ止ルナリ
背而ニナルトタトニ死胎ヲモ出易クナリ頭ヲ生ハルト其方ニ直シ直リテ
出ル者ナリヨリ指テ見ト指ナトナリ上ニサウルフアルモノナリ右様故ナク出タ

片ハ其マ、安眠シカ宜ク静シテ食モ茶モタヌレテ可ク惡シキト窺
レヌ者ナリ此夜先生無効ニテ試ムラレシニ出ヌナリ順ハ失張釣ヲ用
ヒヌト模骨力カ邪ナニナレトナリ
圓生ニカ、ル成ニ若蒲團ヨゴレテアレハ其マ、ミニテモ宜レケレ凡然ラサルハ傍
ニアルハノ薦シ存ラフモナリ別ニ若キ蒲團アレハ其テモ存クカキト何モ
シカス尺ツキ切ハ多ク布力宜キナリ其西方ノ端ニウメシコカ力宜ク然ラサレハ
流シ出ルマナリ殖産ハ其依下ヲ推置キ其底見薦シテヤルナリ
口シ疑タルハ蓋テ皮ヲタクリテ引寄セ出スト出コキナリ兎角陰同ノレナリ
強リ雄實ノ動ス逢ト殖産義覺モ堪殖キモノナリ術力ニト困窮ト出ヌ
者ニ其時ニ出ヌトナリ推置ヘカラス必ス出ヌト云フハ無義ニ是亦出ル者ニ
ナレ氏分シテ窮スル者ナリ慣レルト自ラ易クナルモノ
胎力死スルト胎中ニアルハ蓋ナリ事ナリハナリタケ母ノ胎力弱ク害ヲ
死セヌ内ハナリ十五回アウテモサレモ障ナリ者ニ胎力弱ク生テアル内ニ釣ナス
ルト出產シテ聲ナリ杯スルナリ見老シキ死テト道ニ出スカヨキ其
故ニ其死ヲ見分カズナリ死シテナリ後ル程出ニ殖ク子モ生テアル内ニ子
宮モシラヌ陰戸モ閉ズニ失張出シトスル勢アレ氏死胎ニルト最早殖産
日様ニ子宮内ニ斃ント陰戸モ閉バクナリ子モヒナレモナリ多ク子弱ノ
骨ノ齟齬スルホトスル者ニ今釣ニケラレシ人ノ頸傷レアル人成長シ

死胎衝下

居著り、全体鈎リカケテモ死せ又位ノ子ハ自然ニ出ルヲアリハコウ
ヲ致ミ誤ル可カラズ子カ生テアルヲ知ラ又改ニ傷ケテ啼極ノアルヲ
ナリ

死胎ヲ知レタハ早ク去スヘシ一夜位ハ害ミモナラヌナレタアルト色ヲ
害ラ致スル死胎ニルト前候臭氣アルモノナリ併シ持ミニ臭氣ノ
アルモノハ其臭氣ヲ見ワケ極アルナリ然レ死臭ハ手ナト洗テモ臭
氣去ラヌ希ニ生ツキノ臭氣ハ臭ケル氏洗ハ自ラ去リ其ケミヌス全
体ノ臭氣カ別ナリハ面余口授モ出来ヌナリ
一婦人子宮ノ口開カ又其内ニ子頭ト覺シモノミヘル腹カ破ルコトハ破水ニ
ナリ其候ニカ至テ知レ難キモノナリ爲ト指サシニト自ラ別ルアル者
子カ死スルトエニ冲上ツル上張ニル其ハ破レ腹カ切ル故ニ子カ体ヲ伸ヌ故ニ
下ニツキカケル其極ニ張ニル子頭ハイウチモ臨テアルニ下臨テ出ラヌカラ
下ノ方ニ衝キカケル其レ腹カ形ナリ○此極ニルモノミレ腹カ小便力倦マ
ル下カ又張ル極ニ成リ○此極ニルモノミレモ又二面モロノ極ニト○此極ニ
段々小便押リテニ極ニ張ルモノ生ルト忽チ無クナリ又フカハ張ル計リ
ナリ生タ跡ヲモ寸ハ小便モ通セヌアトチハ小腹痛ノ術カイリナリ
其ノ中ニ又腹腰ノ重ニ極ニ覺ル子病ク下ルモノ大方死胎ノ産ムル者
死胎成テモ母ノ息ミアル余々母健ルニ胃位モ持ツヌ子居ルハ全体

死胎 諸胎 有聲

ニ母健ん弱キモノハ一口モ持ユタスルモ 小便自利ニナルトモ十四
分リモスルト直んも一内モ止又極チルハ六ヶ敷ナリ又難産症疾スル
モアリ三四年モ血ヲヌリ有モノナリ
子頸項ホタ出サレハ死セヌリ破レタラハ死スルニサレ破水スルト大方出
スハ居ラヌナリ破水シテカラハ死胎ナトハ腐ル物カナヒト下リテ止ヌ
リ馬シ又破水トモ水ノ夫ナリ或レ残リエ下ルモナリ其レハ病人ノ
極子ニナリ知レルナリ
死胎ノ出ル時ハ六腹カウト鳴者之ヲ死ニ向ナリハサモナリ之ヲ
經テ息キ位ニナルト事アル者之ヲ不可驚
順死ハ七口位ハ八口位モ死セヌリノ併シ其位ニモナルト出タトモ死スルニ違ハヌト
一母位甚シキハ八口位ニ死スルモアリ出タトモ危キ者之ヲ心得死胎
ニ母ノシマク強クテ出兼ル位ノ一カ宜ナリ實ニ難産症先時分ハ引カ
ル故ニ死スルナリソウナル陰門シテリテ出タリ母モヨキカケニ弱リテ息モ出ヌ
様ナリナリ之ハ子カ死母ノ元氣不相合ニ因テトカ其処ヲヨク見カクハ出ヌ由
テ子ノ死タラハ早ク出ヌト母ニ血痛ムニ子ノ弱キ死スルハ陰門ニツラナリ又早
死胎成テモ其小便ノ先キ通スルナリ不都合ナリトハ自然ニ出ルト云フナリ
其ハ又時刻ノ未タラヌニ三四口モ通セヌハ已時刻ニ過ル故ニ六ヶ敷ノ兎角
ソ時刻ノ過ルト事ナカク一心得ヘシ子ノ弱テ死スルハ未タ時刻ノ未又

生兒狀
為已死

故に陰門のしりまを又故より子頭カクイ違フ様ニシラヌナリ其故は小便を通
スル様イモ有ク其ニ出カケテ出ラレヌ死スルハ時刻ニモラ出ヌ故小便を不利
ニナリ子頭をシラヌナリ其ニ出カケテ出ラレヌ死スルハ時刻ニモラ出ヌ故小便を不利
ク人シ其間母のしりま強キ程出シ難キモノナリ其程子頭カクイ違フ様ニシラヌナリ其故は小便を通
フアンナリ

右面よりハ指シテ知ルニ母ノ方ハ子頭ノ丸ニサリナリ者ニシテ頭カ長
クナル故ナリ母ノ右ノ方ハ五ニ九ニカサナリ
凡生ル子ノ赤聲セ又内ハ肺ハ無キ者色モロクシテ赤クナリ又其死タル
マ生ケルカウ候フハ膈帯ノ根ヲ振ル見ルニ動キテアルハ其息ノアルニ若動キ
ナキ者ハ已ニ死スルナリ後ニアル見ル内ニ微ニアルハコレモ死スルナリタトヘ
見ヌ様テモミル内ニ動クアルハ父生ノ水ナト面ニ脱キ胸ノハ撫カロスルハ其
声シテ心脈モ出テクルニ最モ早隔息ハ施スルナリ必死産ナト心氣
多セヌモノナリ一瞬ナリモ赤聲セヌアリ又難産トミテ生ル子ノ
火熱強キハ必死タルナリ生テアルハ及テ微温ニテ熱キ程ハ無キ
ナリ蓋シ死テ母ノ熱氣ヲカル故ニ聲ハ其初ノ体ハ及テ不抱息且又通
具トノ熱クナルモ因義ナリ

右順産死胎

横産子頭をのけたノチの出来てゝ之ハ出テアルたノチ其マ強クたノ方ニ
引ミて其カラ指シテ物ヲ横腹ノ処ニカケルナリ骨ノけき成カリミウキノ隨分
度ニ腹ニカケ直スヘキナリ付シテ仕セシキモノナリ其レハ段々引カレト是
方カ出ル様ニナリナリたスレハ逆産シテ出ス時ハ難ナク出ルナリ
又其チヲ出シテアルモノカ右カワミルヘシ指シサシミルモノ脊ト胸トノ方
ミクヒ者ナリ又チヲ表裏ヤ何ヤカ通シ見ルヘシ又右ノチヲ腹ノ方
ヨリ出スアリ之ヲ誤テ引ト愈々重ナリ押入レテ宜キ別ニ順産ハ別
ナケレバ之ハ腹ニ傷ク故ニ其上ヘ其チヲカビサシク傷ツク方ニナラメ
見ヘマ様ニスルカ宜ナリ

横産ハ母ノ甚苦ミテ早ク死スルモノ出タチノ張ルアルモノ初メ度々カ
直シテ其物ヲアトニ指シ入ルナリ方々引ツケル様ニサマシ腰カ出ルニ至
光キ上出ルモノ逆産ハ出カハツラハ易キナリアトハ打倒ノ術ヲ可ナリ
余程傷ク様ニ更ヘト至テ傷ナハナリ傷ク位ニゴノウハ上ナリ其
レ故ニ出難キ又右ノチヲ出シアルモノ有モノ其レハ押シ込テ元ノチヲ
出スカヨキ又邪チナチ子ハ其傍ニ格置テノチヲ求ムヘシ若其人右ノチヲ
引出スカ至ラズケ敷ナリ其ハ物ニノ口スカヨキ順ニ出サレハ無様ニナ
ルモノナリ心術ヲ右ノチヲ引又様ニスヘキナリ順産ヲモ若其腐爛シ
テアルハ腹中ヨリ突コミ内ヨリ掛ヘシ其様腐ハ親ハ死スナリ又及テ

頭カ桑成テ出レ善者若シ免用出ヌク時分おせ子ハ親ガタカラ又
者ナリ又ヘキ時分おスト甚后クレトヌテ出レヨキナレ其出ヌ可
時分サモ失フハ至テ出レ難キ者ナリ中へ突ムモ合セメニユカヌ
蘇スルカヨキナリハワレル者ナリ

横産ニ右ノチタル者先キミテ出ル者横産ニ右ノ方ニ向ト云モ全体チカ方
向クトミナリ偶々ハ左ニ向クトアルハ横産ニ左ノ方ニ向ト云モ横
産ハ順産ヨリモ六ヶ敷ケレハ順産ハ至テ六ヶ敷アリ又易キモアリ
横産大抵チマツアル者ハ横産ニモモ見カ見ルカハ何ノチナリ直ニ
出ルモナリ

横産ニナルトチ死スル故ナリ生テガル内ハ横産ハナラヌモノ死テチカ無キ
故ニ親ニ息因ニ勝リ必チ押ス故ニ横ニナツカチ死スルト思ハ誤ナリ
横産ノチ邪ナナル様ニ思ヘ有寸六及チチナレ使用ミナリ若邪テ
ト思ハチ推入チモ直ニ入ル者ハ面チ出ル者ハ横産ノチ顔ハスリト生者
ナリ但横産ニチ出ルル者甚チ難キ者ナリ横産テハ足サへルトチカ直
ニナラナリ

横産ハ頭トモニナルナリチチ押シテ直ニ出ルモノチチ押シテ直ト息ニ強
ク自然ニ出ルナリナル者
産横モ死胎ニ術ハ順産ノ死胎ニチ回生スナリ横産ハチカト萬三モ生テ

居ルアル故息を強クナルト自然ニ出ルアル者ナリ又胞衣ノ紐ノ先キ
ニ出ルアル者ナリ之モ死胎ナレトモ息力強キハ自然ニ出ルアルアリ
ヲ出サトハ之モツラト直ニ出ルト莫クハ故ニ病家ニ入リ居住リ直シテ
置タト云フアルト不問出テカウ向ニ受ヨク出テハ術ヲ用ナリ
計リ先ニ出ルアル者ナリ胎盤ノ先ニハアルナリ常ノ通出者ナリ
ツ重シルアル者ナリ之モ力ハ出ルナリナリ出スアル者ナリ難産ナリハ頭カ出
タラハ直ニ指シモルヘシナリアレハ直ニ引出ス可シ否レハ手カ重シナリ

右横死胎

逆胎ヲ見ラ頃ノ子頭ナル処ニ足アル故ニクルタト出スアル者ナリ頭ニ大キ
ナル者ナリ

世人多ク横死ガツ離レテ無レテ下ニアル外ニ見テ子カ下ニ在ル者ナリ同蓮
ナリ頃産ハ頭カ下ニ在ル故ニ胎カ小サク頭ハ大ト云フ氏女ハ腰腹ノ際胎カ大ナリ故
目ニ立又逆ニ頭上ニアル子胎盤薄ク故ニ減タラズ胎カ高ク時ニ足伸
頭カ在胎盤ノ尖ツケ痛ナリ其故ニ下モ折々足モコウコウ痛ク疼クナリナリ
ナリ頃産ハ胎盤ノ先ニ出ルアル者ナリ胎盤ノ下ニ衝上スル様ノアル是モ子カ横死ガツ離
レ上ヘアル者ナリ其ニ指入ホドモ子モ離レテカハ折々ナリナリナリ
係シ横死ノ処ニ三指ヨリ指別ニ離ル者ナリ

逆胎ノ別
婦中下産
室有逆胎

ヨロノコアルモノ、決メ構フモノ、非ス、忍ビテ容レ可シ、逆産水アル内ハ推
逼テ可ナリ、若破水シテ、指ニ是ノサワル様ニナレハ早ク出サ子ハ死スルナ
リ、逆産ノ子ノ生テアル内、忍ビテ出シテモ、若ナリ、何テモ早ク出スカキ
ナリ、子アラウクスルト死シ、産クシテモ死スナリ、子ノ骨ヲ折ラヌ様ニスヘシ
キ、マカリニ、氣ヲ付ヘシ無理ニ引上、皮ヲムケル、コアルモノナリ、
懷妊中ニ下ニ水、氣アル始、終アル、沖カケル様ノコアル者ナリ、其レハ逆テ
ハ無キナリ、田飲ノ致スルナリ、折々思ヒカケ無胎下ニ沖ハ逆ナリ、又腰ヘ
ツバリスル様ノコアルモ、逆胎ニアルコナリ、順産テモ、大様ノコアル
モ、逆ハ、胎下ニ沖者、コリシ、此ハ、月位モナラ子ハナキナリ、初メ向ハ小
キ故ニ然ラス
抒例モ、腰カケハ及ハヌナリ、似サセ、様ハ、圓生ノ通、ソレモ、冬テ、直ニ足ノ出テ、息
ミノアル位ナリ、其マ、坐シテ、カヲテモ、コレモ、在者、レ、而テ、短ナハ、圓生ノ様、似サ、云
ルカ、若ナリ、キヨウ、サ、腰掛ナトスルハ、先セヌ様、スルカヨキ、ノ、胎、腹、テモ
矢張、腰カケハ及ハヌ、又、テ、身ヲ居ラント、チカ入レ、ニクキナリ、病人ハ、矢張
似サ、レ、ムカヨキ、ノ、男、女、ニ、別、バ、サ、キナリ、ナレ、ヒ、多クハ、女ハ、腰ノハ、ル者、ニ、然、リ、ナリ
逆産、ス、チノカ、ハ、ルカ、出レ、難キナリ、胎ノカ、ハ、ルト、云フハ、ナク、若、レ、ト、モ、向
ズ、ナリ、ナリ、皆、チノカ、ハ、ル者、ノ、腰、骨ノカ、ハ、ルハ、無テモ、其、コ、カ、ミ、ヲ、見、テ、直ニ
サ、エ、ス、レ、ハ、出、ル者ナリ、何モ、陰、口、ノ、兩、傍、ニ、カ、ルト、云フハ、ナキ、ノ、尾、骨、骨、ニ、ケ、レ、テ

在壯胸壯尻

正産ニ是モ何モ出スアリ其能サリ見テハユラ又之是ヲウ宛出スヘシ又
 少シ是カ出カハツテアル其少ク出シ又一本ヲ出シテモ可リ本ハ少ク
 一本ハ正産ノ極ナモアル者又西氏出テ布ノ如キカハモ有
 先其方カモウ気ヲ付見ルヘシ其出又ト云ハニカハミテアル故之其方カミ由テ
 真術ヲ行フヘシ

碩按此處
有誤

而曰子ッテチン出シ足リ出ヌ様轉變スルコハ無キ者ナリ其様自由ニ
位ナラ出易キナリ但シ赤タ月ノ足ラ又四ニ脱スル者ハ胎ノミナリ無キ故ニ
色々ト轉變メ不定ニ脱血ノ者ナラハ其レモ無キナリ又積産ハ増月
ミテモ始テノルカ段々ト方々ト來テカラ積ニ當ル様ノナリ
逆胎モ是ヲ出メヨリ妊ルト子ハ死スルナリ早ク出スヘシ出シ様逆キト
必死スルニ逆産ハ男ニ在ルヤ種ノミナリ様ノ使ハナラハ一婦人ニ三産三度逆
ニ胎死シテ他ニ嫁ス妊シテ又産正順ニ是ニシテ見レハ女ノキコヲ強
ニ産ナトモ稱ニシルト云フナケレモ全体ノ生レキニ回ラフニ故ニ難産スル者
ハ多クハ難産スルモノナリ
胎シテ見テ逆ナラナリ知リ是ヲモサハ様ナラハ早ク出シテヤルヘシ未タ指サマ
者ハ指置ニテ可ク其内ニ至ラ氣付ノ強キ胎置テ見入スヘシ自然ニ生
アル者ナリ大方チノ知テカハル者ナリ其ハ早ク出スヘシ其ハ収サレタニ枕
シタカ右カノ方ニヤラヌト尻ニ布ク故ニ子ノレヌナリ花カ右カニ枕ヲヤリ
カラ仰ケサスヘキナリ易キハ逆ヲモ安産スルコトナル者ナリ指カ障リ
カスルモ母ノ氣付ノヌルキハ指ヲトケテ早ク出サズバナラヌナリ母ノ息
ミサヘヨケレハ随分自ラ出ラ待テモ可ナリ
逆産ハ少服ノクナレタニ物ノ障ル者ニエノ類見ルヘキナレバ及テ上
方ハ尻モ大キキ者故ニナリニクヒメ下ノクレニヌル足ノ方ヲ見ガキニ動クモ

下痛曲飲
逆脈

下ノ方動クモノナリ腰シツム痛ム候ノイアル者又右ノ脇下ツムハ候
一時タルナリ痛ム候ノハ腰ヲモ曲飲ノモノナリ逆ハ折タツナリ曲
飲ハ冲候ノイ無キニ全体心下ハ逆ハ高キ者ナリイモ曲飲ニモ高キナリ
逆産ノ足ナト出ルハ取ラズテ引ト直ニ張ル者陰門ノ内ニアルハホソキ
ナリ障テ又モフトク張レルモノナリ横テモチカ出ラアルハフトク大人
ノチノ候ニナリ者ナリ其フクレハ当飲ヲ煎シテサシ酒ニテ飲ミ
ニ直ナリ
産右ニ足ナトノ痺レテ伸ヌ候ノイアリ持子候ニ坐スル故ニ然レ別ニ産
ニ兆スニ年モ直ラヌイアリ基テハエカヌレハ当飲ヲ三升ニ酒ニ合テ腰
陽ヲサスルナリ
逆産ニ子頭ヲ出スルニ口ニ指ヲ入レルハ只上ニ轉スルニテ強ク引トガツル者
ナリ横産ノハ手足強ク引テ横ナリナリ強ク引ト當カヌルモノ節カ
ヌアルト強ク引カレ又皮ハ直ニナキル者逆産ハ頭上カ切タル候ナリ無ク
ニ日モ産レハ直ニ子宮ノ底頭ヲ付テ産改テ切タル候ナリ無ク
逆利子ト云フハ只横産カイルノ拾別ニ腰ノ張ルホトイハナキ者ハ実ハ社
尾ノ内ハ又ナリ只直ニサスル可ナリ以テ交骨ノ力カレ故ニ然ラナリ右
左ノ力ハ積故ナリ交骨ノ力右ニアル積故ニナシ又右ナリ横骨ノ力ナリ
知ラヌナリ交骨ノ内ナリ無キナリ又順テモ之ニ輕ク出ルハ兒頭モ拾別

長クキレハ長キ者ノ回入寸ハ横骨ニノ頭カ長クナルモノナリ
リト知ルベシ

在逆死胎

此產モ皆倒ノ術ヲ出スヘシ若基レテハ曲生極出スヘシ臨產モ此產
ニナル者多キ初カウノ此產ハ出ラカウ足カ多ク伸又臨產モ力見重アルハ
直ニ直レ此產ノ足ニ指ニテ斗リカハ者ナリ篤ト指カ掛ラ又ハ又ナリ
カラ極ムヘシ尾カ口ニ臨ム位ノハ子ハ死シテ有テモ母ニ息ミアルナリナレハ右
ニ元代ハ出ル其家ニカメキハ指ノト、カヌモノノ隨カ入ルニナリ押ニム
ニ入者大指ハ入ル者ニホスリト指ヲ掛ラ引ヘカナリ口ニ指ヲ入ルハ
尺ウツカ又極ニ子頭ヲカワス斗ナリカラ用テカヌトデモ雖產ハ出又内ニ
アル者口ニ臨ムハ出モ易キナリ

在坐產

九難產ハ順逆横坐四ノ其外ハ色々変スレバ皆出シテ難產ハ取微
弱ナルハ甚惡候ナリ生ルヤ否ヤ微弱ニカモナリ弱シ氣ヲ付シ難產ニテ横骨
モ大アルナリ者ノ子宮ヲ斜ノハ昂ルハ右ニカハ故ナリ子宮ニカハナリモ
早ク聖ヲ用テハナリ保シ其位ナリ子宮ノ口ナキ以テハ無キ者之内

（鈎）入レテ寸ハ出ル者ナリサレヤリミクヒナヒ随分格別ニ大歳無キ之
子信常ノ上ニアルナリロハクルトヌケル者ナリ

血暈

血暈レテ引込様ニ正振ナク寝ル者兆ニ世多ク頻ニ赤け下テ引起シテ
録サレタス所ナト喫シメサトスルナリ血シメル茶エラ用テ可ナル何レ目覚
シルハ驚シ、訣メ症置レ其候ニテ死ヌル者兆ス事度試ル引起シテ
目覺タ寸ニ脈ヲ見ルニ忽チ驚リ死ナリ寝ルト又脈を戻ル又不覺シテ
自ラ驚キテ引込様ニ又忽チ醒レシテ不靜正氣ヲ方ニテ
言達ヌモアリ又靜ナル者力年煩ヲ悉ク胸腹ノ痛ヲ極ヨナト云
者皆惡ルニテ多クハ死スル者又自ラ血ノ滿リ知リ又下ル下ル度
ニカシヘス者猶多クハ死スル者又自ラ血ノ滿リ知リ又下ル下ル度
必死ノ症ナリ候其候モタエ死スルモアリ又一旦危リ靜ナルモヤ
極ニナルト顔色青モ大要ナリ息ツカヒモ大息ニ極ニナル極ニツテモ
靜ニナルハ死兆ニテ又初メ寢シカタル者兆ト異ナリ其能寢ル希強テ
起スヘカラス茶セヌ可ク偶々ニ目覺メハ茶ヲヤルキ偶々ニ自ラ目
ノ覺タサハ脈カ早急ナル況ヤ之ヲ起スガ先脱血ニオサメルナ段
カ死ニ世佐ヤヌスハ炭ヲ燒テ所ヲツキ臭之而テ付下血ニ無

用ノナリ目ノ覺カ宜ク動搖シ目ヲ驚又ハ甚惡シ捨置凡其ナリ
ニ死スル者亦ス可心得總體世人ハ所ノ希ラ鼻ニ入レ氣マサレ心得
ハ同違之者所ハハシメル者故ニ誤スルナリ產后血ノ下ルヲ言ト
スル故ニ所ヲ又ハフヲ忌ムモ曰義ナリ
実暈 硬血ニカクキニ桃人承氣散衝入ノ後可ニ虚暈ハ人連ノ後ナレ
茶ハ甘、道者者ナリ術ニハ收メルカ早ニ實暈ヲ引ハタリル様者ハ
桃人承氣散や花虚散ノ者ハ膠散ニヌクヲモアルナリ
實暈ハ地脈ニ足厥冷スル様ニ至ラヌナリ只引ツケル迄ニ或ハツリツ
キヲ自ラ服カ肺クナルノ氣カ速クナルト云フ引ツケルノモアリツレハ其
終ニ夜寝サスレハ善ナリ心カメテ起スニカラス又暈ヲ引ツケルナリ禁
暈ヲ引ツケ安収セシメ又術ヲ用ユルハ度ニ直ル者ハ實暈ハ後口ハ様
ナリテ腹ナトナリ見ニニ宮カ上ニ上行スルカ見ユル者ナリ其ナ宮サエ治マ
ハヨナリ脱サセシメハ氣ツカイナキ脱血シテタルハトテモ可ハヌナリ
心厥冷シテ脈ヲ絶シテハ血色紫ヤ白ヤト云様ニ要スル様ニルトナリ安
眠サセトテモカウハ煩燥起ル不安ト云様ニツツ中々収シテハ居レヌニ
正氣昏冒シテモ心様ニル者ハ必死ナリツレカウ后ニ静ナリ欲震様
ナルト是ハ實死スルヲ引ツケル始煩躁サレ無レハ構又ナリ何ノ死テモ
始カウ之ヲ死スル者亦ス必且煩躁シテカウ静ニ死ニ至ル者ナリ又脱

血又モ其後実内ノ弱クハ暈スル極ニ死スルモアリ一既ナラハ先其
息ツカヒノ毒血ヲ見ルヘキアリタト（実暈スルハ短気ナクハ極ニナル
トハ死ナリ）ホリ脱スル者ハ仁方ハナキ者ナリ中々毒カノ及ブ者非ス先
辰砂散ヲモマリ置ヘシ湯ニ三萬ノ解キ用ユルト喚ノ出ル者其息タラ
シク死スル極ハサモナルハナラヌナリ二暈ニ惡キハ収サシムルハ減スル寢
テハ居ラヌ者ナリナリニ敢テテ色赤黄セハ度リ合フモアリ
食暈ハサシタルナリナリ食調ヲ回シ具症胎極ニ悪ク目杯ナラキマ
ル極ニナラクルハ此ニ向テ構ワヌ者之安臥スルハ必ク目ヲ愈ルナリナリ
安臥セヌハ九極ノ一ハ無キナリ枕ヲ卑クシテ安臥サスベシ暈ヲ養
スルハ産后ナリ四一四ノ除ニ限シモノナリヨリ短ルトハ極ノ一ハ無キナリ
又産后ニシテ病シ又死スルナリアリセキナリナリナリナリナリナリ
全体実暈ハ子宮ノ収フニトナリナリ故ニ上ニ暈スルト上ニホリテ有極ニ見ユル
病ハ子宮ノ常ノ如ク何モ別ニ子宮カハルナリナリ無キ故ニ子宮ハ矢張ナリ
アルベキナリ

禁暈ノ術ハ実暈ハ用ルニ虚暈ニ暈ハ果以サヌトニ虚暈ハ收リ
接ヘルト血脱スル極ニナリナリ要キニ只寢サスルハ可シ大抵収サヌト直ニ者
ナリ虚暈ハ寢テカラズ只胸下ヲ如ク輕ク収スルニ虚暈ハ子宮カハル
是ハ嚴シク下ニ引カヌニ收ルニ押シテ居ルトモハマ起ラヌナリ虚暈ハ引

付ハ無キモノ、倚引ツテ様ニウ、ト面ヲ振フ様ノ一モアル者アリ
煩悶ノ多シ、ソレハ近死、食暈モ引ツケル無シ、其氣尚スル故、脱血ノ方ニ
似ル様ニ引ツマウニナレ、全体カ輕キ故、自ラカレ、重盛暈ニ食ノ停滞、
故ニ脱血モアリ、吐食モアリ、全体ニ食暈、吐食スル、ハ跡サツカ、通ル、
何モ損ヌモノ、産前氣付、ウク、内ニ強テ食スル、力カ停滯スル、若シ婦人
好サエモ、人強テ食セシム、可カラズ、多クハ臨産ハ食ハ欲セヌ者、産后ニ食
ルカ、何モタマル、法テハ、ナリ、可心得、ナリ、禁暈ヲ収サス、最初ハ子言
リサレ、高ク枕シ、ウレカラ、又高クスル、椅子ニ居、スハ、先手ニナリ、押ハ
カチ、ウク寸ニ右ノナチニテ、版ヲ接ヘカ、ノナチニ、其下ノ蒲團ヲ、持テ、一カハ
人ニ持タシメ、テ出シ、ソレナリ、收術ニテ、持テ、アケ、足ヲハ、ウシ、ナリ、収サス、
子ニ居、子ハ其、終ニ収サス、何、從時、虚暈、テモ、收術、ニ、収サス、ハ、版ヲ
接テ、ハ、ナリ、又、版ヲ、脱血、シ、死スル者、モ、下カ、ナリ、改ニ、接テ、モ、可ナリ
版ハ、サ、ウ、ス、者、肥衣、子、食、内、ナル、モ、血ノ、収、又、内、拾遺、カ、子、ナリ、又、
血暈、ハ、年、起スル、ニ、ト、食、其、ハ、ハ、初、又、其、内、卒ニ、起、行、ツ、キ、右、側、
スト、云、ハ、右、ハ、燥、アル、故、血暈、ヲ、起、セ、又、ト、云、ナリ、其、構、ヲ、モ、非、ス、咳
ナト、ハ、右、下、ニ、ス、ト、甚、ク、ナリ、者、勞、暖、ノ、多、モ、見、ナリ、
產后、上、又、極、ニ、氣、モ、遠、ク、ナル、様、テ、モ、版、着、シ、子、宮、ノ、収、ト、ス、ル、者、ハ、訣、メ
死スル、氣、カ、ヒ、ナリ、何モ、拾、別、ノ、ハ、無、シ、ナリ、ヨ、キ、故、痛、ナリ、

日本書紀
顧慙者
抵諫

血脈暈ハ半時位ノイニ死スル者又暫ク死モセズ収リモセスト長引モ
アリ一日余モ引ナリ大抵持マズ急ニ死スル者之収リ面ハ脈を戻リ
テ来リモ五ニナリ一時位時分天抵ハ死生ハ分ルナリ脱血モ暈ハ何
モ構ハヌ者モ
虚暈痛ナク実暈ハ脈ヲ痛ム者之虚ハ術ニハ方ス者之収サシメテ
見テ若ルヨリ外ハナキナリ

痼

劇シク産スルハ又女子母ク血之具起トスル此ハ必腫子カカニテクダス
ル寸ハタス産前ニ産スルモ又初ク産后ニ産スルモ死スル者之産トナ
ラスハ八九内ニ産スル者ハ必死スルモ内ナク産テ輕キ寸ハ死セヌモアレト
モ大方死スル者之子痼ナト子カ痼ヲ病ニ由ルハ形ナリ何モ子故テハナ
シテ産本上ナキモラフナリ子ハアルモ産后モアレハ子ノ為ニテ又ナリ可知
痼ハ術カ重ニ此症モ下ラヌモノヲ治ツカヌトナリツカヌナリヲ治ツクト
五ニ下利カツク之産ヨリハ愈レテアリ全体ハ難症ナリ
痼ノ起ルハ驚ニ非ストツサシ回ニ驚キ処アルセムルナリ其レ故ニ初産
ノ者多ク経産ノ者ニ稀ナリ
痼ハ子カ突ニ非ヌ面ハ血カ冲アケルナリ横ヨリ押ス時ハ子ハカニナリ何

産前病
可救産后病
而産而死

子ハ多ハ死胎ナリ又押タテ子ハ死スル者ニ非ス其病ノ多スルハ何レ也
四リ也ウケル外ナリト見エリカラ徑中ノ一及フ病故ニ子宮ニカハルヲアラ
全体ハ産前ニアル者ナリコレヲ持ツモノアリ又別ニ産后ニ出スモノアリモ
アリ何レアルモナシ者アル故ニ多ク死スナリ不問由何術ハ即チ救病ナ
リコレモ愈ルモ待ヨリ外ハ無ク故ニ子病子胎ノ各目ハ又ナリ
子ト云ハ子ノ為ニ出スモノハ産后ニ出スモノアリ産后ニモミアレハ一概ハ
云ハレヌナリ産前産后ハコニ云如ク先前ニカハ様ニナル者ニ安ク皆ニ及ル本
ヨリ胞衣ナリ又前ニ出スルハ難産ナリ又先胞衣ヲ出スハ又又収近見合サハ
又又之聲聲ノ症ハ必易産ノ后ニアル者ニ安産メ悦フ内ニ直ニ暈ヲスル
ス者ナリ心得ヲクヘシ
病スル者ハ人事ヲ知ラヌ者故ニ版ヲ見テ三寸ト指シテ見テ可ク主頭ナ
ハルカ子宮ヲ開ルカ見ルヘシカスハ何モ面赤ク目ヲ引ケ其内ニサシカ見
ナトミテ催ノウウチ吟味セズ尼指ヲ見ルカミテ産前ノ病ハ産后ニ大抵直
ルナリ催カ付ト早直ル者ナリ産后ハ收マルヘキ者ハ故ニ死ス故ニ産后ノ病
ハ甚要候ニ后ニアルハ必産前ノ病ニ産前則ハ産后ト云アリ又先カ
ノ方ヘ目ノ腫カヨウテカラ又中ニカハナリコレテ実ハカノ方カ惡トミ其
レ故ニカノ方ハ動キ難キ者ナリ右ノ方ハ振タセバナリ者スナリハ引ツケル
斗ミ何モ煩燥スル者ニ非ス唇モ紫ナリ面色モ甚ク悪ク之収テカラハ反

胎中を病ハ
其子必死

分娩後血氣ハ
フルト云意

子煩燥メモルナリ收マル前ハクシタト疾カ咽鳴様ニルトチツ高シテモ
ヨキコ收ト目ヲフク様ニルツカラ不斗煩燥スルナリ者之何モ物カ突刺
込ハ者ハ非ス只里ク礙ルナリ大抵九月臨月ニ至ル見ル内ニ目ヲ肉ニ其
レカラたへ引ツケルアリ其ナリニ引ツケスニ落ツクアリ子病ハ寝メナラワレ
ナリ起ルハナラヌ癰病ノ劇キ様ニモナリ大方墜胎スルモナリ先カ付ト
落ツク陰に近子頭カ下ヲクル收レ其ナリト出スニ又癰病スナリナリ
正氣ハ故ニ氣ノ付ナリ知ラヌ故ニ人カ申所スレ能クニ氣ヲ甘テ早ク生ヘシ
否レハ必死スルナリ大抵自然ニ生ル者セ内位ニ病アルト輕キハ其ナリ
ニナリツキ臨月近モ持テ安産シテモ子ハ死スル者ナリ中モ子ハ後々ハ又ナ
リ總テ病ナラ直ニ氣ウク者ハ直ニ指メ候又子頭カサワレハ早ク生サナ
子カ出スニ死スルナリアリ病ニ死スル非スマダ子頭ノ下ラヌ又ハ指置テモ
可ニ病ハ正氣ナリ故ニ探官シテ見ルカヨシ子頭カサワラヌ又子官内ノ肉
クハ出シトスル勢ナリ指置テモ生レバアレハ毒ヲ出メヤルヘキナリ又黄
辰砂ニ茶末更湯ノ羹ヲヤルヘシ何ニ茶ハ大抵キカヌ者ナリ收テ正氣
ナリ故ニナリ横ニ引テ茶ヲヤルヘキナリ決シテ茶ヲ飲クモノニアラス
茶ヲ横ヨリ流シテムヘキ曲頭者ヨリ指ニテ肉キハルカヨクニ産后ニ再
産スルナリアリ先ト一寸止者ハ臨産ニ不斗病ノ死スルナリ直ニ出ス産
一カ二カ死スルナリたスレハ病ナリ子カ助ルハアランモ大方血氣血シテ子死

足腫頭痛等
病之前兆

產多在產
后十日外

スル者、麻痺ヲ生ル、子カ大ニ死スル者、是モ血ノ動アル故ニヤ血動キアル
テ生ル、子ハ大ニ生長サウヌリ、痼ノ初産ニ限ルモノ、二度カウハナキ者、
一人ニ度ニ痼ヲ棄シ臨月ニ生ミテモ死セヌ但成長セヌニ良モクハ又骨
モ立ヌ目モ見ルワウ知レス四年程生テ殖ナク不斗死スルナリ此痼リ
テ時モ痼ノ子ハ生ルト云フハナキトミヌテノ二度目ニ棄シ位ノ輕キ痼故
四年近モ生テ居レバ成長セヌ極ノアリ、痼ノ起ルハ足カトシニ必腫カ
ル、又必腹痛カ、四前カ、四前カニル、アアル者、其外何モ前様ハナキ、
何レ痼ハ血ノトコニ淀ムトミ、其レ故ニ引ツケタリスル、アアリ又腫カ
多キ者ハ、互テノ棄スル者、アラス痼ヲ棄スルハ其前頭痛ナアリヤ、肉
フニ必アル者、

痊

脈ノ至テ堅硬ナル者ナリ早ク下カキ之中々下リ難ル者下サハ死ス若下候
ニ和クモアル者ナリ病人求氣ナトヤルヘシ多ハ胸ニ雷鳴シテカカリ下カ
ラ其ノ下ラズ以病人氣ハタシカニテ常要ナルヲモサキニ必ロウ禁ミテ
遂ニ舌ヲ引込テ極ニナリ其ヨリ肩力疑リ強クテワレカラズ張スルナリ
中々術ハカリミテハユカ又湯茶カキナリ其内目ハ常ノ通リミ引ツケルハ
無キ者ニ脉モサシテ変スル者ミテハ無ク本産后ニナキ者ミテ多ハ小産

隨胎石最多

右三石者ナリ小産后モ及易産ニテアトモ快コクナリモミテアルコ
具快ニ任セテ色々傷キテ卒然ト起ルナリ先隨胎后ニ限ルコトモ輕キ
者ハ無キモアレハ大方有ルモノハ小産后モ不斗有ルコトモアレハ先必墜
胎后ニ限ルモノト思ヘシタクハ陰門ヨリ口ノテ外ニ出スルナリ破傷凡ト
曰義ナリ膈凡モ膈ノキワ痙レテ膿ヲ出ル様ノモノニアルモノナリ凡
トハ異ナルナリ矢張産ナリ隨胎后ハ産后ノ様ノモノナリ無理ナリ
者故ニ産ヲ棄スルナリ此術ハ只病勢ノ劇キ処ヲフセクモノナリ中モ服藥
セテハ直ニ又之

乳

幾重モ舐探ミテ柔ヘシ出カレル寸ハ止メルト又ハ出止モク又乳ハイカニ吸
スカ宜シ元三三乳疑リ出ル者常ニ但シ三四吸頃ヨリ出ルモノアリ雖乳未
痛吸フヘシ世人サシキ乳ナト云大抑殘ニ様ニハ不知モ若カクヌハ后ハ
無ナルコト三三ニ疑ル中ハ他見ミテ吸出シ囉ヘシ初産見末々吸フ
一強カラス多ク出難ナリ世人乳ヲウケルコト産クスルコト甚可ナリトス
一通常ニ先生曰九乳ハ天ノ典賦スル処ナリ其六出栗フルヨリノ飲
スヘシ自然ニ其末々出ラヌ内ハ飲ヌ可ナリ大抵三四汁リヌト出ルモ
ナリ又乳ノ頭破レ裂ルアリ乳ヲ飲ム甚痛ク嫌ナリ飲サヌ様ニ

スル愈凝結シテ陰置ト后ハ害ヲナスイカモ吸出スカラ若シ何シ痛
ニ堪サル故ニ別ニ胎ノ如キモノヲ作テ人ヲシテ吸ハシム其如ク世倭ハ
小兒カ齒ヲ立タサトス左ニテ又自然ニ出スル者之且孔カヨリ
刺第ノ如キ如キモノ出ルヲアリ此曰前痛ムモノ之乳ノ凝ハ恐シ
キ者ナリ大抵三四フリ程ニ惡臭ナドスルト凡邪ナド云フミアルナリ
此乳ノウサヨリ出スルナリ其後陰置ト乳カ出又極ニナリチ極ニ極
ルト大抵デハ不治ナク早ク操リシ凝ヲ散ス義段々アリ
一蒲公英末 生々 水仙根 丹波中川氏
二松栢葉末 施刺福井氏 余別圖外モミアリ 余載セズ

右ニ方席上 記如即即壬申三月廿四日

乳ヲ凝テ赤ウク様ニシテ早様ム位フテハ方ナリ大抵膿潰スル様ニ希
具ハ凝シテトルカ宜キ併シ其膿潰セ又内ニ早様ヲ直カキテ一度膿潰ス
乳道塞カリテ毎産乳ノ出スル者ニ又膿スル様ニル者之乳頭カ乳カ
ニ如斗ノハ陰カサシメテ出ルヲアリ若シ乳ノ上面生スルハ下ヨリ去下生ハ上
ヨリ出ルヨウナリ下右ニ生スルト乳ノ通シ減シテ言ハ産婦ハ得テ
凝リ易キ者乳ヲシテ能ク散シテハ得テ凝リハ無キ其乳ノ滞ル
ト所謂乳癰ト云様ニナレ是ハ構スナリ乳癰ハ危キ
乳ハ夜カ寝テ乳ヲ飲サ子ハ自ラカリ者之乳ニホリスル 夜サ飲サ子ハ自

コトカル者之故小兒も寝乳ヲ飲サスト瘦ル夜ハ氣ハタラキ無サレ故ニ乳モ
多シ出ル者之故又夜ハ乳モ多キニ乳ノ濃キ者ハ長ク持テ若シ生レタチノ小兒ニ
半身モスル乳ヲ飲スト小兒ノ大便通セヌ極ニテルニ一年ノ乳サレハ一年ノ子
ニ飲スベシ荒乳ハ能ク大便ヲ通スルモ之故小兒ハ通スルコトモ之故丁度ヨ
者之年ヲ短タ小兒ニ荒乳ヲ飲スト必下利ノウケル其荒乳ノ下利ノウケルハ
切能カキカラニ其粗乳ヲ年ヲ短タ小兒ニマスカハ不苦ニ世ハ下利ヲウケ故
ニ乳ヲ飲セズ子ハ精又者之故乳ハ腹ヨリ吐ク者其モ溢レテ出ルノ故ニ只ハ
コトカラハ出ルテリロヨリ吐乳スル程ノ勢ハキ又之モ乳ヲ飲セズ半身モシテ
カラ吐乳スル様ニルハ代テモ可ト通ラヌ又ヤリテ日マ有ハ通ニ乳ヲ
代ルト道ニ又ヤリテ吐乳スルト通ニ代ルト道ニテアリ引ゲノ乳
様ニツテハ吐乳スルニ乳ヲ飲ハ内御事アルト其方ハ努曲リヒケル故ニ又
乳カ色クナル者之故ニ乳母ノ乳ヲ飲スモノ其乳ノ力ハ弱ニ乳ヲ飲
水カ曲ニ様ニナル者之故ニ夕ト曲ラス内御スル乳ノ切能カ悪クナル精血ヲ下取
ル故ニ

婦人ニ曰フ上セ強ク頭痛ヤ偶ヤ熱スル様ニ上運スルト必乳ハ出ヌ又乳ニハ
血運ヲ密上ニテリエニ様ニナル劇キハ乳乾スル様ニナルマアノ
乳房ハツラシ又ハ急ニ痛ムニ病アナルハ凝張スル乳又之具ハモシテモ出
ヌハ脱血症ナトハ必乳ハ出ヌ者之大抵三三〇ノ昼時カラ出カレハ張カケ

施座重頭
痛振寒有腹
乳之也

ルト小兒ヲシテ飲ムルカヨキ不熱ハ凝ナリ二三日ハ産前ト曰極ナリニ
至極ヨキ者三三日ノ向ニハ血モヨク下ニカリルニ子ノツカカリナレ故ニ下ニユク
ナリ二三日メ位ナリ下ニ行ヘキモ力上ニナリ乳ニ入レ具レ故ニ三四日位ナリ
ハ下ノ下リ物カサリナリ三三日メカハ腹痛振ヒナトナルモノ其ハ
乳ノ張ントスルモノ病ニ非スト初ヨリニムカヒ置ヘキ他小兒ハ軟シテ飲ミ
ムニ甚シキト上セテ振寒ノ頭痛ナレ乳カムナリ凡邪ニ非テ佐乳振云
大抵ハ乳カ来レ程ニ故ニ小兒ハ飲ミナリ又故ニ乳ハ力敗ナリナレ
三歳位ノ小兒ナレハ多ク飲ム故ニ搗ミナリ小指ハ乳カ不足ニナリ而シテ位モスルト
足又ナリナレハ三歳ノ凝リハ吸出スカヨキ又乳房ノ痛カト云様ノ者ハ左
ニヨリ出スルモノ一月ニ月ニ月ニ月ハ九四程ヲ凝ルナリ其ハ茶ヲ
傳ルヘキ色ツク様ニナルトロク者ハ膏内茶ヲワケニ括置テモ精ナリナリ
ケ又極ニ早ク乳サハ吸出セハ直ル者ハ散シハ焚散散リ傳ヘシ乳房ノ尖
リニ一寸黒キ者ハ張ル様ニ成テ吸付ハ甚痛ナリ吸付ハ張ル様ニ成テ
ムニ付シ吸付ルトハ切レ者ハ膏内サリハ内ニ母ノ血毒ナルテ産
ナトナルモノニ乳ヲ痛モノ多ク又平生乳頭ノ四角極ニ尖起セ又者ナリ
其ハ極ニ引ト出スル者ハ具ハ必ス産後乳ヲ痛モノナリ乳ノ飛ハ乳ノ女
キ多ク産後ハ飛極ニ出ナリ内満ニ故ナリソモ子ノ飲極ニ乳ノ多ク
テモ飛ハ極ニ出ナリ者ナリ乳ノ咤天キニ舌ノ房ハサシハ咤天ナリ

席大キテモ世小サキハ馬ヤ之乳ヲハ小サキ程ヨリハ乳ヲ大キテモ世力小
サキト宜カラヌ之世ハ一寸五枚位ノ処力上品ナリ小サキミ至テハ乳ヲメ位
テ世ノサキモナリ馬ヤ之乳ハ膚ノ色ト内様ニ白キカキモ其黒キ葉
ト馬ヤ之膚色ホトカヨキ之乳ノ加能ノ善惡ハ黒血ヲ異ル之乳ノ多ク
ハ世ノ大サナリ黒キハ全体血毒ナリナリ又産力ハ一生黒キナリナリ乳ハ
口ノ上ニ向カヒ垂テ下ニ向カヒ大指ニ垂ルカラス惡キ出テ乳ヲ不飲ル
カヨリ我レ置テ全ク又根ニナリ之矢張飲ミサヘスハ精ホ相成ニ出ル
者ナリ或ハモロヒ乳ヲレテ夜ノ飲スナトスルハ又ラ又根ニナリモ之乳
ホ又処カラノ熱ハ石黒前ノ産世又内ノ乳ハ当ニナリ又小サキ様ヲモ嫌スルト
大ニルツアンモノ中品ノ小指下品ノ上品中指ノ末ノ舌死スル他
児ヲモ飲ス力佳キトナルト馬ヤ之
小産隨胎后ニ乳ノ出ル位ノハ未タ善之要ト出ヌ者之三千日乳出ル當ラヌ
病ナラハ何モ三千日限ルツハ無キ又平生ナリ三千日モ出テ最良出ヌ
産症ナレハ月ハ發行無カ多ク早ク出ルハ其乳濃ト云ハ薄ナリモアルモ
ノ其様ニ早ク血ヲ回ルハ乳力悪ク故ニナリ在凡ラ産スル在凡ラ母ノ經
水カ卑ク回ルモ之乳ハ赤計ニ出テモ切能惡キ故ニナリ在凡ラ母ノ經
スルモ多ク其動其血ハ通リノフアル其レハ惡し隨テ房セヌカ
善者之産前ハ及ニ障ナリ右ハ且謹ムヘキ其レ故ニ保水凡ル人

其乳ヲ飲サカ善ク三年モ経水ノコアリ具レハヨク三年ト云カ即
 一年半程ニ當ルニ往水ノアル乳ヲ飲ム子ハ慢狂ニシラ又ニ弱キ者ハ一年誕
 生ヨリ内ニ短水ノ四ハ要キモ小産后ヤ子死シタハ早く乳ヲ飲
 ス故ニ下ニ早ク回ル故ニ三年モ過テモ乳サハ飲内ハ短水無クテモ乳力
 此方カラ往水サカハ要キ病ノ故ナリ吐乳ナトモ有リテサレ云者ハ凡
 是ハ死スルニ生テモ平生ノ人ハナラズ之平生慢狂トナリ吐乳スルヲモアレ其
 ハ精ヌナリ故無クメ吐乳スル極ノ者ハ愚候カシコム前ニ平カ吐乳スル極ノ
 一アルモハ此方凡ノ極トハ反ラサキモ之痘瘡ミテ引ッケルモナリ其レハ
 吐乳モナク熱甚キモ大抵三歳后ニ能キ者ハ赤ノ三歳過ル内ハ最良ナ
 キ者ニ三歳后ハ引ッケテモ凡ト云レヌ無キトハ云レシ吐乳下利症ナ
 慢狂凡ト云モ虚ニ属ス不斗凡ニヨリテ出来タリ名在凡トナリテ子ヲ
 症ナリ后世ニ此ヲ慢狂凡ト云ナセニ在凡ノ名ハ無ナリ

子室

子室内面ハスバリシタ者モ虚ナトシ解テ見ルニアサタナラニウシマタトシタ
 此様ノモノアリ人ノモサアル一婦人死后ニナリテ見レハタカハ
 子室内面シマシセシモ男子ニサナサナ子室内シマナリ所泉ノ説ニ論
 不可提

子宮脱スルハ歎ハキハ入レモ三年モナルト入レテ血ニ出テ強テ入レル時ハ力

サレ本年モリヨウハ歎ルヲ早キ

子宮常ハ脱レリテ指ニ本位ハ入ラレ氏ニ本ハ入ラレ又子宮ハ中ニ大ニ張レ

ノ常ハ抽テ程ニスボミアルナリ平生ニテモ指リ入ルハ血ニ口ニ薄レモノ

尤モ人ニ由リ保ク指トカ又極ノモア氏大抵皆薄ク之歎ハ復加ヨリ

易キ者ハ脱肚ハ痛アル故ニムカシキ子宮ハ束積厚ク歎ハスルモ中

々下ノヨル極ノ者ハ津ヌ指ニ裹メエカシム下本ノ腹アル故ニカニ成リ

合モノ其ホタハ其マニ入ル

子宮脱スル婦人自ラ下ル極ニ着ルモノサシ子宮ノセヒタ浅クナル其レ

ハシカチキ入テ脱モリシムト歎ハスル陰中ニテサレ下ルハシカチ無キ

指ニ傷カヌ極ニスル成ハ自ラ収ル者カラヲ用テ荷物ナト負フ者

マアルモノ子宮ハ脱アルト云ト臟腑ヲ押ケ腹ノ上迄モ伸ルモノ勝

脱ハ子宮外ニテ前ノ方アル故ニ小便ナト溜ルト子宮ヲ押ケテ胎カガ

アル者ニ至胎ハ下ニ下ル程着キツナリ前ノ方若小便ノ溜ルノ故ニ

部ノ極ニナルモ此レノ子宮ノ脱ハ長ハ八寸位ナリ奥近ハ幾ラト云ハ知レ又

ナリ時アツテ大小ニナルト早キ上ノ初産ハ子宮ノ内ニ難キハ陰門ヲ塞フセ

八歩位ニ出ラアル者ハ指ニ着テモ子宮ハ出ルヲ云自ラハワレ者ニ子宮開

カ又内死スルヲ大抵ナリ子宮ハススハ自然ニナリテハ中モ開ク者

非スニ度目カラハ鉄メ子宮ノ邊ク出ルモノニ非ス年女テモ内ノモリヨキ
人ハ有ルヲモアル
初産ハ子宮ノ内クモ遲ケレ氏其レモ産ナ劇易ニ由テ具ナル後産テモ早
キトハ云レヌ

陰門

陰門ニ敷エミ膜アリ平口無用ニ属スレハ産ニ臨ミ此膜ナレハ傷宮ナリ此膜
ミヲ伸廣クナリテ一向構ヌ
陰門ノ堅ク固クアリ施死ノ如ク初マ死セシ内ハ不強ニ柔和シテ陰門モ初
ヨリテ固ジシヌアリ又中ニ只固チ引シタル氣味ノモアリ死胎ナレバシメル
故ニ頭面ナリ方ムナリ其死シタルハ
ノ時ニ頭面ナリ方ムナリ其死シタルハ
アルニ死胎故勢ナク骨カ動クト見ヘ生テカレハ固ルモ不強ニ柔和スルヲ無
尤ハ中シヨリテアリ足攣セテ入ニ血ノチカラモ別ラヌアリ
産産ナトミテ赤肉ノ出来ルヲアリ子宮脱ニ似レ氏異ニ意師ヲ希ナト云フ
ヒノ下リテアル様ノ者ニ此ハ血色陰門ト異ニ紫黒ニシテハ指テ毎カホリカ
コハ切落シ老血ニ変セシ赤ニナリクハ寸ニ遠カハルモノニ子宮脱ハハ
アリ赤肉ハヤナシ子宮脱メ五ニ者ハ徑水カ其内ヨリ火テ快ナリ又陰
門ノ内ウチノ大ナル者アリテ陰門敷リカハハ極ノヲモアル者ニ陰門力餘

蓄薇油

肉脱ノ本名ナリ 男子陰囊ノ様ニ堅ヤモノ 平生ノ生付モアレン
 又水翼ノ長キモノアリ 俗ニ前垂ト云是モクハト切レルモノ 尺子ノ註ニ尿
 翼ニ詔出札者トアリトリ 眞長キモノアリ云々 吾國俗ニコト云
 一アリ即秋月福井氏札戸ト云一アリト云ヘリ是ノ又丹波ノ人ノ
 註ニ女子モ勃起スル一アリ 或ハ夜婦ノ一ニ夜敷カテモ度カル様ナレモ
 尿翼ハ動揺スル一アリ 勃起ト比シ云云 何モ女子モ勃起云云 床内ハ垢穢骨
 也小便下道ヨリ出ル者ナリ 隨分陰門ノ中ニテ結フ又ハ其根ハ陰中夜ニ括リ
 又ハ蘇因脱モ才カウ房ニ障ラマハエニテ故ニ昇アセシモノアホニツケテ
 括ルヘキナリ 毎カ括シ連スル 四指スルトハ淫モ 血モ出ルハ無キ
 陰中フ候フハ一指カ蓋キ 尻門ト會陰トハ平生寸斗リモノ之陰産ハヒテ
 三寸斗リモナルノ初産ナトハ別シテノヒルモノ
 人ニ由テ陰門上下アリト云 其ハ無キ 何レモ後門ニ充テ寸タズニ極リ
 タルモノナリト云
 陰門腫ハ針スレニ帯下ナトモ腫ルヲアルモノ 其ハ針セラレ又ハ初産モハ
 多ク陰門ノ腫ルノアルモノ 會陰ノ如ク破レルヲアルモノ 其ハ會陰ノ外
 外ハ傷ケハ直ニ之指又破レルト云ハハ必會陰ノ如ク之外ハ破レルモノアリ
 陰門ノ傷ルハ愈易キモノ 之聖王ニテ兒頭ノ針破レルモノハ手ヲ傷ル
 一 血モ不出痛ムモノ無ク直ニ愈ルモノ 因テハ熱アルモノ 痲ハ早ク

陰門洗法

愈下見其故救ヲ出シテ其跡ハ直ニ通ルモノ本サハ出ハ胎漏ニ
此ニ然ラバ口中ノ痰ナドノ早ク愈ルヲ熱アル故陰門ノ液ニタニハ膏ヲ傳フ
ハ直ニナリ膏陰ノ外カサレ切レルモノ之膏門ト云ハタル由ニ其レニ切
レル者テハ無ナリ膏陰ノ傷レハ縫トモ云フモノ其レ故ニ膏ヲ傳
置テ膏門ノ痕ミ居ツマシメテモ搦テモノ初産ノ必陰門腫ルモノハ小便
シム者其レハ野蓋薇油或油ヲ綿ニ浸シ置キテ可ニ三度カハ無ク陰門
ノ痒キハ蛇床子明雄三精五倍子ノ煎汁ニテ洗フ陰門天傷ツカサニ養
ツ生スルカ又ト直クマトカハ里僻ニテテ堅クナルモノ口ヲ輕ルト自ラ直ル
或陰門ニミリ堅クナルアリ其ハ油蒸ヲ傳ラヌニ外面ノハ油蒸傳ルヲヨキ
ナリ針シテ血ヲヒロウレデハ直ラヌモノ多シテ傷クアトハ直リカタクナルモ
曰義ノ老婦人ハ裁メヌモノ故ニ箇向ヘキ之固ニ男ノ大物ヲクアイ
ノ悪キモアルモノ其レハ男ハ女ノ極ニ思ヒ女房モ生涯知ラヌ故ニ自
分ニカアルト思ヒ苦シナリ
子宮ハ陰門中ニ在ルモノ孕ト截府ヲ押シノケテ腋ノ上ニテモ伸ルヲ勝候子
宮ニメ前ニアル之故ニ小使ナド留ルト子宮ヲ押シテ胎力傷ヘユカムアル
者ナリ孕胎ト云ハ尼姓スルト云テ熱スルカ也平生ハ冷ル人モアルカサレ尼姓中ハ
五テ無クモナリ五テ熱スル之生レバハ五テ大抵ニ無キ者ニ冷レ之
ナト冷ルト云キナリ暖メルハ惡シ一概ニハ冷ルカ者キト云ハ凡ニ物身ニ冷

ルナリ瓜ニ破テこいハ車ニ足カ出ルモノ即探倒ノ術ニテ出シテ公兵使
テツギミナ色ト啼又極スルカ直ノ婦人ハ胎衣ノ太キナカホト云ニ敗キ胎
衣ヲ太キ寸ハ血塊ト云テ出スカ善ク之胎衣ヲ直ニ出スカ善キニ在子但
ミ引ト両方凡ニ出ルナリ長シ而方ノ因取モ在子ノ紐ヲ先引出シ置
一処ニ持テ引カ善ク之初ノ子ハ在子ノ子アハ故ニ眞ニ残リテハ故ニ右ナリ出
ルカ及テ此ニナリモノ故ニ之ヲ先取ルニ産婦甚ク哀ヘハ口直出シ置見
合スヘシ全体ニ子ハ難キヲハ無キナリ一子ノ出タ際ハ息出シヨキ者ハ双順モノ
レ民其モカノ方カウ先出スカ善キニ處テニ子ノ巨ニ残リ取ルナリたニ寸ニ及テ
出又故ニ在子ノ方ハ眞ニ突入レ置テカノ方ヲ先出スカ術ナリ又双逆ニ稀ニモ
ナリ双順通トモ大方胎衣ハ拾別ニテハ若シ此ニ子ノ子ノ子ニテ候ニクモ
ナリ本ヨリ氣ツギテハ出更カラヌナリ
孕胎ニナル故ハ知レヌナリ或ハ二夜ニ二度モ行フモノト云ヘバ或ハ三夜ニ二度モ行
人アリ回ミテホタ是ラノ一ニ近夜サヘ無キト云フカスレハ一度ニ成ル者ヲヤ
孕胎小キ子ニツ在アリ又二ツミヲモ大ナル子ナレハ分チ難シ今世前ニ出ラ
弟妹トスレトモ不妊ノ先出ルモノ長クメ可シ
臨産ニテ頭ノチニサワラヌニ袋ノ様ノ物当ルホタ腹ヲ脱セヌナリ又双順
ノ孕ハ大方死胎ナリ出シヨキ者ナリ右ノ子ナドハ別シテ出シヨキニ双胎ノ
横産モアル者ナリ初ハ横ニテ又ホタ横ニハナラズ子ニ反右ヨリ出カ弱キニ横産

スルナリ生テアレハ横ニ生ラヌ又者之双順ニ生ラヌ死スルハ皆横ニ生ラヌ者之ナ
 シ氏出シヨリ故ニ動ハ入ラヌナリ又者之横ニ生ラヌ死スルハ皆横ニ生ラヌ者之ナ
 ヲキ方故ニ出ル之逆ニ出スモ此義之双順ハ自然ニハ出ヌ又之方ヨリ出ヌナ
 リ其是ヲ氣ヲ付ヘシ双順ハ死ニハコヌ又之双順ハ是カ死ニ出ルヲアルモノ
 之右ノ方ハ奥ヘカシヤツテカチカチ方ヲ出スヘシ
 双順ハ各ニ胞衣ノモノナリ双順ハ一胞衣ノモノアルナリ又順右逆ハ順ナリ
 故ニ胞衣ノモノニ二ツノハ無キ是ハ変産中ヲハ又正ナリ故ニ胞衣ニ
 テ知モ金ツアル之双順ハサシ変故ニ胞衣モアリニ胞衣モアリ膈帯モ各本
 アルナリ中ニ膈帯モ各本之双順ハ変故ニ各ニ胞衣モアリアルカ正体ニ胞衣ニ各隔
 テナリ膈帯モ一本シテ枝ヲ生スル極ノ一アル者之此ハ変之
 又順右逆ハ一胞衣双順ハ一胞衣ニ各逆ハ各ニ胞衣
 呂胞ニ三度出全セシモ皆順逆ニテ一胞衣ニテ隔ヲ有テ各膈帯ナリ者ナリ
 併シ尺山ニ無キ者故ニ其ナリ知レヌモノ



厥胎ニテモ二子死スレハ必皆死スルモノ又并ニ生トリテ二子死アリ此ハ自然ニ變故ニ
 其例ニハコヌナリ又年月経テモ死スレハ必皆死スル者ナラヌ何分出テ一日ニカ

此症ハ筋ヲ引ツケル故ニ面ニ身動キナク又其レ故ニチリ雪ニモ初ハ赤ニシテ
ヤル可シ徐々ニカク用エニ近來ハ此症ナリ尾ヲ強クサテハ其ヨリ水下リテ
傷産ミナルニ子頭ニ近キ故ニ腹ナトリサテハ反ラ構テツリ皆整胎術ヲ用
ニシ

胎必右ニ依ルモノ必右ノ腹ニヨル下ノ方ハ中央ニアル者ニシハ必横回サテ背面
テナク右ノ方ニ向クモノナクコレ故ニタレモ右ノ方カ産動クモノナクコレ是
住リ傷ヲト頭モ必右ニヨリ足モ矢張右ニ在リ同ニ左ニ向クモアリ尤スハ
同ニ左ニ高テアルモ知レ又併シ至テ稀ナリ母ニ引ツケルハ大方右足ヲ引
ケルアリ整胎ニ直ルモノ似サシムル直ルニ臨産ニテ子頭カ横骨同ニテ
ハ整胎ナラヌモノ横産ニモ必死ナリ出スナリ

抱カ子方知ヌアリ月ハ大抵カサナリ七八月位ノカクマリアルノ候ニ其マ
テアル足ト思シタカノ大抵右ノ手前ノ腹ニ右ノ中間ノ指ヲ白ノ腹ニ
テ接テ時ヲ短ク内ニ兩足ヲシメラレ故ニタカトカクンタカ何カ指ヲ滑ル極
覺ル者ニ全休ハ右ノ手ノミナリ格シ見テ自ラ動揺スルアルモノ其ヨリ
ハ輕大指ト次指ト子頭ヲ右ニト振テフルトヒヨク指ヲサワルモノ其ハ誑
テモ價レヌト甘々知レヌ者

復胎

篤ト津唾ヲ手ト尻トニ傳ケ是ヲ入レリ大和寸又出ス者易入而互テムコアリ術
疔瘡人ヲ臥サシメ背向ニ帶位ノ者ヲ入レト中ヲ高シオク寸ハ能入テリ長ク
細ク脱スルハカタク手天ニ脱スルコリハ入易キナリ而チミテ引ヨセハ指ヨリ
メ入レ推ス可ナリ津唾ミテ宜ク油多量宜カラズ少頃尾分論悉テ盡可
ナリ意ハミテサシキ者ハミテサスレ或ハ入ル寸海帶柳ナトツケ
ルコアレ津唾力宜キナリ又ミテサク脱スルハチニ握ルニ足ラヌアリ此ハ大指
ミテ尾指骨ノ如ク推ミシヨリカ右ヲカシ入寸ハ能ク入ルモノナリ
脱肛一カマニヨリ根メテ跡ノホメク者ナリソハ指置テモ通ルモノナリホメ
キモ強ク上ス寸ニ油ヲサシメ竹木ヲ受ミテ綿ヨリテ其尖キヲサシテ其油浸シ
背方ニ向テシムナリ半カボト入ル処ヲオモヒテ直ニサス綿ヲロキ殘ミテ其油浸シ
シトルハ大便上テデルト又サスヘシ侮シ大抵ハ指置テモ構ヌ
野蓋薇花ヲ四カ便トリテ蓋中ニ秘入レテワレハ胡テ油ヲ入レトミテ其ノ極ナ
ミレテ氣ノヌケ又極ミシ其後日中ニ毎カサラス工用殆ニミテ所ハ花采ノ
如クアルニ絞テ花ハ捨テ其油ヲフラスゴヘミ入レ直トイワテモ腐腐ノ又ナリ
其花ノ腐ル極ナハ要キミ早ニ能クシマリカレハ花ハ腐ルモノ也スラノ
ヒキテ取テモ可ハ侮シ極カクト腐ルモノ油ヲトルカ腐ラヌ又妙ヨナリ
熱シサスモノ陰門ノ腫ミ熱シサスニ用テ可ナルミカチヲ膏内ヲ代用テ
モ可ハ陰門切レタミモカチヲ膏内ヲミ之實ハ指置テモ可ハ

覆疾

產后寒戰咬分ヲ救血ト云ハレ又氣ヲ元ナレハ安産産ミモアルヘキナレハ難産限
 ルハ即是難産ミヲ難産ニ成シタ故ニ卒ニウロクト寒ミヲ免スルニハ脱血ナトハ
 又テ寒戰ハナキモノハ其ハ脱血モ外ハ冷ル様テモ内ハ熱アリテ自ラ寒
 ヲ覺ヘヌリハ食滯石寒戰スルコトアリ又テヨキ方ハ何ニテモ不固寒ハケリ
 アルハ是ヲ用エキハ易産産ミヲ冬ナトニアルモノハ水ニ隔レル者ニモヨク瘡
 ノ後ニテモ往來寒ミ熱ミヲ隨胎ノ振マ肥衣下ニテ振ナトハ後合之ヲ
 用ルモ益ナキモノハ其病人ノ帶ソトキ片ハダヌカス向ハ其温ミ衣物ヲ膝
 下ニ入レ置サメ又極ニナシ置ヘシ又此術ヲ用ヒテモヤカス振ハ大程劇ナキ者テ
 ハ無自ラ血ニ去モノハ冬ナトハ產后ニ必守テモ冬夕産セ又内火隔ナト
 ミテ温メ置ヘシ早連キカハサスル寸ハ其連ナクモ一実内ヨリ病ヲ出スル
 ハ中々服薬セズハ血ヲ又アリ外カラ暖メルナリハ血ヲ又者ハ若病アルハ
 搖置テモ血ニ熱ガ出ル様ニ成テ寒ハ止モナリ血リレヲモ無理ニオサ
 ルトナリ甚シク熱ガ出ルナリ

難病

産中ニ病者ヲ見ハハ惡シク多クハ墮胎スルモノハ胎中ニト其母必死スルニ若

下子ハ精ナリ、故テ傷寒ナトハ下ヲ著シ、産ナトモ構々ナリ、何レ病ハ
 血ヲ傷損スル故ニ下利中子生レトモ下利清穀ニナリヌ、又ケニ下利ノ重死
 ナリ、一可シタル下利ヲ著タルモ子カ生レト猶ウ下利ノ止ヲ極ニナリ死スルモ
 アリ、可心得僅ノ下利ヲモ妊中ノ大要症、痢疾ハ程急後重通シ短キ
 者リ、産后ニ之、又ケニ下利ヲ著タルモ其レを看カアルハ未タ可ナレトモ痛ヘタ
 ク無キモノ、必死ノ病、治ハ初メ下利カ宜ク易症ナレハ尚々早ク下
 リハ早ク通ル物、体妊娠タリハ傷寒或ハ何テモ病ヲ得ハ胎ヲ抱ホ
 ス世上多ク胎ヲ抱ハ故ニ治リ誤リテ難症ナル者アリ、其病サ、陰ケハ血
 氣ヨリナリテ自ラ子ノ為ニ重ナリ、決メ子ヲ障ルモノ、難ス尤モ治リ誤リテハ
 論ナレ方症サ、相對スルハ何モ害スルハ無キ理、可心得、昔南涯先生モ
 毎度云リ妊中ハ惣テ胎カハルヘカラス病サ去レハ子ハ無事ナリ、病カ有ト
 其ニテ胎ヲ害ス者、勇テ劇峻ノ藥ヲ用レハ母タ子ノ為ニ害セヌ、只其病ヲ
 攻メ要スルノモ俗医、ヤハモスルハ産后ニ既ニ血ヲ神ナト云ハ先モ虚状ナリ
 キ、臨胎后ナトモ決メ神フナト、附子割ナト用エヘカラス、必死ニ至ル、縦
 令虚スルハ藥ヲ血カコレウヘラレ、看ハ血スル者ヲ去ン、其ハ自ラ血カ順環
 スルモノ、附子ハ血ヲ動搖スルモノ、先血ヲ収カル者ニアラス
 妊中ニ淋疾アリ大方血淋ナリ、婦人ハ内府瘡ノ様ニ膿ハ出ヌ、持コシテ
 五斗モ十年モ通ラヌ、又一モアル、マヤンモノ、解毒藥ハ處セヌ、極度最力

能たスル之用ニ他方ハ決メカナリ血ノ出又内ニ宜シ劇クナルト必血
カ出ヌナリ男モ血海ナレハ能たスル
懷妊中ニ水氣テ顔脹スルアリ矢張血カ主ナル石黒割ヲマルカ至キナリ
榮物ヲヤル水氣モ具上ニ上ルニ付留ル様ニナルモノ
足ノ痠痛是スルモ痛ト痠スルトアリ腰以下ノ役ニタハ又様ニ不仁ルモアリ腫
レルカ小水ノ不通シナルモノハ味丸ノユク様ノ症テ小便セテ思テモ氣
カ四リ方又故ニ小便出ヌ其様ノ者ハ子宮近モ收リ遲キモノアリ皆
氣ノ即リ更キ故ナリハ果テノ症又半身不遂ノモアリ痛ニ三年過
ラヌモアリ沈疔天ア一ニテ宜キ又痺シテ足ノクマツクアリ矢張脚氣
ノ治ラ施スヘシ水腫ノアトニ歩行ナリ難キモ又自多思ルモノナリ其ナト
以症多シ轉胞シテ術ヲ通スルト自ラ小便ノ通モノノ格シテ居ルモ覺又
モノアリ不仁ノ症ナリハ果ツアルモノ其様ノ症ニ腫物ヲ養メ死スルモノ
リ其レハ氣カ回ラヌカ腐ル之何モ瘡後ニ潰ルヲハアルマシト又難産
后ニ腰タヌニ自利シテ痛ハ瘡ヲモ生シテ愈ルモアリ小便自利ハ必陰
門ニ出ハ年生尿道陰門ニ通シテアル穴ナルト見ス常ニ其穴上ニ古ノ様ノ物
アツテ穴ヲ塞クトニ具古無クテハ止ルヲモナラヌ様ノモノ難産ニ其穴
カ廣ナルト其ツカカシマラヌ故ニ自利スルヲ傍シ見又故ニ其ハ知レヌ
一婦人妊妊七ノ程フナリトシテ何カ力要キナクシトアリ一食モ能食フ

食在、愈々爵スル、経日似レテカリ、氣ヲ爵スル、ソレモ食カ、此方ヲリレカ
初ヨ上事セテ彼ノ弱ヲヤルヘシ、室心サヘナレハ食セムヘキ、リレテ初日ハ四ニ三
次ガ、食カ増シテカラ、収セ又極ナリテカラ、並ナリ
陽スルハ、隨分、散スカ能ク、コララ、者、非ズ、飲ケ又多、不、通、ニル、見、タ、ケ、ハ、面
ルモノ、其、陽カ止ム様ニナルト、其、食減スル、陽止シテ、食ヲ思フ様ニナリ
モノ、塩物ヲ食スルト、陽スルハ、如何ヤトス、塩ヲ食フト、腹カヘラヌモノ、其、
故ニ、陽スル、ナセカト云、働キテモスルモノハ、塩物ヲ好ム水クサキ物ヲ好ム大
方、腹弱キ者、故ニ、塩ノ事ヲ、陽スルニ、非ズ、腹カヘラヌ様、腹ノ大キナキハ
塩事キ物ハ、ソヘヌナリ、水クサキヲ好ムモノ、義ニ、塩ハ物ヲシメルト見、陽スルニ、水
ルヨリ、食ヲ減スルカ、ヨキ、脚氣、塩絶ナトハ、入ラヌ、又、ソノ、塩、又ヘヌ、ナリ、弱ル、ト云フハ、無
キナリ、衝ニナトシテ、クルハ、食ハ止ム、ウウ陽ナトヤルカ、直ニ、湯ヘルモノ、オナツキテ、カ、食
ヲヤルヘキ、否、則、不愈、産后、扱ナトサメテ、カ、后、又、シク、盜汗ナト、出ルモノ、アルハ、構
又、並ルモノ、虚汗、盜汗ト、異ナリナレ、血、減スル方、故ニ、サシテ、構フハ
無キ、女子生レテ、后門ノ穴ナキ者アリ、因、婦人、穴無キ子ヲ生シ、無難
ト子、諾シハ、先生曰、女子ハ、保ナキ者ナリ、近ク、見ル、如、テ、赤、肝、ニ、布、之、ト、ソ、小、兒、ハ、
不、便、氣ヲ、付、シ、ハ、陰門ヨリ、生、異、切、シ、ハ、サ、ミ、出、シ、カ、レリ、ト、リ、リ、氣ヲ、付、シ、ハ、后門
無キ、外科、近、頼、虎、切リ、虎、キ、膏ヲ、系、ナト、ケル、后、ナリ、シ、カ、口ヲ、經テ、傷、ハ、
ナリ、別、虎、ア、ケリ、又、陰門ノ穴、無キモノアリ、無、非ズ、薄皮ノハ、ツテ、アリ、テ、通

陰中固根
此奇症

セリナリ一人又因脹滿ノ如クナリシニ服藥又治一日刺ニテ見レハ前陰ナリ
出テ紫色ナリ故ヲカケリケレハ医ヲ招キ相談シ傷レキレハ血未ダ全愈トナリ
誤先生ノ語ニ大和本草ニ其術裁ニテ切リヒラキ石炭ヲケレハ愈トナリ又曰
未タ癒セサル処女ニハ薄膜アリト云ヘリ賀川先生ハ尤モ此ノ發中セリ
實ニシテカフル道ノ情欲ノ度ニ推シ用リ氣果ニテアクトメ腹カアル下

世ニ初血下リテ又ロリ經テ子ヲ生コトアリ俗人ハ初血ヲミマヤリハ產ト得ヌ故
ニ季胎カニ度ニ出タキナリ様ノ一モアルノ中ノ大方血ノ下ルモノ又肉ヲ胎ヲミ
タ様ノ胎衣ノ腐リタル様ノモノナカバ前ニ下ルモアリロリ經テ又小產スル
モアリ血塊トハ云レヌ又季胎ノ半カカ出果害フタトモ知レヌナリ季胎ノ自リ經テ
生レルト云フハ無モノノ臨產前ノ病ハ並リニクヒモノ

一婦人因横タナリテ肉ノヒルコトアリ產后ニ横タワル故ニ交ルコトナラヌ又肉ヲ
ル術ニ中ヲクミリテ中ヨリ切レテ而方ニ端ミワキ愈ニ總テ陰中ノ疾ハ並リ
見ヤス

經針ハ名ヲ不ノ凝タル用ルニ試ニ右ノナリ脊マワレ上ケテ其大指ヲク心裏
ヲ付ケ置キ其骨ノアル処ハ筋ヲカヒニミルノ度々サス血ハ出ヌモノ痛
トモ無モノノ生后ノ凝タル人ハ刺シテモ可ク大抵ニ歩位入レニ痛
ニ血ヲトルニ針スルニ針スルヨリハ先他処ニ刺ラズ其レカラ其凝リノ甚

頭痛用針

シキ処一刺又カヨキ一カニスルヨリモ二度ニスルカヨキ一
スル者針スルト忽チ面ルモノサノ痛針スルト痛ニツテ
癩癩ニ然カ病車ヲ一具七日酒ミテ服ス本ヨリ黒焼ナリ
虚勞ノ症ニ息タワシク類ノ病ノ動クカ見ユル者下ハ必死スナリ
吉兆ニ血胆ト旁トニ由ルト云ヘ氏更胆ハ食ヲハスル一モアリ
勞ニハナク
曰得ニ氣度スレバ旁ノ人食シテノ瘦ルナリ
要胆ハ食セヌニ瘦ルトノ別
モナリナリ

食禁

幅産ニ食ヲ推シ強ラ食セシムルハ及ハス食カラチツカヌ
スル者之若シ劇シクナルト下ノ張ニ障ル極ニナル
方ニ産座トテモ強テヤルハ要ス免角病人ノ思マニ
ヤルト筋滞シテ要ス産座トテ婦人ノ意ニ任ス
其内何モ平口ト妻ナ
ハ無ケル此当分ハ血氣ノ躁動トナル故ニ多食スルハ
氣血化シ難キ
故ニ要クノ粥ノ多シヤルベシ
梅里更ノ多シ禁スレバイラヌ
其内病アレハ殆ニ從フ

雜類

婦人平生肥短ノ人多ハ前張りニ下大シテ胎別ニ服大ニ下カ下ニアル様見ニ
清癯ノ人ハ大程ニ大ニ下マシテ胎ハ上ニ多シ是ノ多ハ易産
血室要食ノ府ト云フハ如何シテ云ヤ何レ其美否ニアル人多ケル人ニ由テ妊
一概ニ云ハレ又ハ血塊ナラハ頻ニ小クナルヲ有マシキ易ナリハ九月不見其
妊スニ婦人妊スニト下部張スル故ニ尻力益出ルモ故ニ仰臥シメ直ニ越
サスルニ得起ヌハ妊メト云ナレ此ハ当又ナリ知体婦人ハ尻ノ大キナ
者ニ平生ノ婦人ナレ以テ直ニ起ルハナラヌモ男ナトテハ大キナ
無ク又婦人ニモ大キナ又者其代リニ腰ノ幅ノ廣キ者ハ腰ノ短ト見
ルト如クニ尻力大ニナルハ大程ニ云ルニナクテハ胎ヲ孕ムハナラヌナリ
頸帯ハ六月ニセ又ナリ六ケ敷ト云フ嫌ヨリ五月内ニカニスルカ俗例ニ世ニ
甲トテ男根被ラセテ御スルヲアリ又因誤ルト脱産スルト陰中ニ残ル
アルモノハ花園ノ話ニ一人陰中ニ物アルヲ覺フ患トスル者ナリ飲シテ挾ミテ
出セシモ驚甲ノカブトアリシカヲ賀川先生モ此ナリ頼シテアリトノ係
以寺ハ直ニ出ルモノニナリ何モ六ケ敷モノニ冰ス必子宮外ニ在ル者ニ推置テモ
自ラ出ルモノナリ

或曰女子ハ母ヨリ男子ハ父ニヨルト冰ナリ然男ニヨラスメ女ニ精ハキ
蜜煎ヲサスニ心得アリ矢張背リ方ニ向テサスニ具カラ直ニ押シヤリ指サ入
レ第ト奥ニ入レ子ハロニアツテ空出ルヲアルモノハ里ク嫌テ早ク融化スル

極ニスヘキナリ指スニモ初カラ直ニサスト入ラズニタ、クレテ入ラヌモノ
陰囊ニ傷クトカ死スル者又陰囊ノ本ヲ切ルト何モ捕ヌモノ、畢竟ニ傷
クト版ニカスル故ニ死ス官刑モ陰囊ヲ斬ル然ルト陰情カ去トリ陰茎ヲ
畢竟アルト甚々氣カ悪キトシ陰囊サキキト盡チトナリ情
以薦ラ易ク衣服ヲキカシムルモ格別ノ危篤ニサレハ捕々民疾人虐脱シ
ルハサシモ動カサレヌ其時ハ其上面カナラノ神ヲカシメ別衣ヲモセテ置ツル
ニ稅モ別ニ其外ニシテ蒲團モ一枚別ニカミテテ折テ下ツケツノ寢カヘリ
サスル方ニ布キ蒲團ノ四方ヲ三重ニ折テ持テケ其新ニ布シ蒲團ノ上ニセテ
曰ク蒲團ヲトリソレカラ彼ノ衣物ヲトリ右ヲ被セ左ハ衣物モ被カヘル其カ
折テテ蒲團ヲノ寢サシメル綿衣ヲミテ半方ニ折又之長ミテ折リテ
肩ノ下ツメニカヒ前ノス子當リニモササキ堅蒲團位ノ物ヲ小ク折テ挟成ニハ
一寸モ動クツハササミソレテ安産スル寸ムカニハ床リ合テ直ニナリ難産必ズ
用ニ其内平生ノ大病タリ氏衣物ヲキカヘハ以術ヲ用ニベシ又其寢テ居
ルミミテ被更サス一モ出スルハ前ノハ衣ヲ上ニシテ若ルヲ二轉シテ右ニス
ルナリ名モナラヌ又ナラハ初ノ如ク蒲團ヲサシ深ク穿テ方ヨリ押入置其
ヨリ前ニナリ是ノ方ヨリ前ニ蒲團ヲ引出ス寸ハ其マ、ミテ事
水腫ナトハ以サス一ハナラヌミドミカ直ニナリモクレル位カヨキ足ハ投ケ出シ
テモ構ヌナリ傳シ出シテノナルト多クハ下ニスベシ其代ニ蒲團ヲ一尺ナリ

ちんまそ

折リ回ケ其処ニ尾カユク極ニ眩セシムナリ勿論其蒲團ノ上ニ別ニ
シク之以ストウモ二重ニシテオルト心モチカ養ナリ
貧家夜着ナキハ蒙ニテモ好キカケニ括リテモ可ナリ

ん

300-

MS B 535 v. 1-2

